AD

CATALOGUM

PLANTARUM

HORTI REGII NEAPOLITANI

ANNO 1813 EDITUM.

APPENDIX PRIMA.

NEAPOLI;
EX TYPOGRAPHIA AMULIANA;
MDCCCXV.

BOTANICES STUDIOSIS.

Miraberis fortasse, benevole Lector, quod vix, vel ne vix quidem exactis duobus annis ab hujus Regalis Horti Neapolitani plantarum Catalogi evulgatione, nova accessione adauctum eumdem prodam. Sed numerum adequisitarum, hoc temporis intervallo, plantarum, Botanices in dies incrementum, ac denique grati animi officium, Catalogi nostri praepoperam amplificationem tu ipse postulare fateberis. Quum enim herbarum ac seminum, quod inter me et praeclarissimos viros Botanices cultores, per totam fere Europam dissitos, institutum fuit commercium, ea felicitate processerit, ut mille et biscentum praeter eas, quae in catalogo continentur, plantae, jam hortum nostrum locupletarunt, earum numerum haud spernendum pubblici juris minime facere piaculum erat. In hoc autem peragendo illud procul dubio negligendum non erat; quod grati animi testimonium iis praeclarissimis viris praebere mens sit, a quibus eas accepimus. Inter eos honoris gratia, in antecessum recensendos opinor Dominos ac Doctores *Fischerum*, *Juntiltium*, *Luykenium*, *Hoppeum*, *Jacquinum*, *Roemerium*, *Thouinum*, *Decandollium*; *Dejean*, *Noccam*, *Balbisium*, *Harmanum*, *Harduinum*, *Scannagattum*, *Targionem-Tozzetti*

Savium ac *Tineum*, qui *Moschae*, *Vilnae*, *Berolini*, *Amstelodami*, *Monachii*, *Vindobonae*, *Tiguri*, *Parisiis*, *Monspelii*, *Lugduni*, *Papiae*, *Taurini*, *Mediolani*, *Patavii*, *Bononiae*, *Pisis*, *Panormi*; *Gorenkiano*, aut Imperialibus, vel Regiis Hortis, summa cum laude praesunt. Nonnulla insuper pro horto sicco, a clarissimis viris *Pearsonio*, *Sprengelio*, *Schleicherio*, *Moricando*, *Sebastianio*, aliosque quos silentio praetercam, nec tedio tibi sim, accepimus.

Iis omnibus gratias perquam maximas, et meo, et discipulorum meorum, nec non totius Gentis nostrae nomine reddendas esse quis dubitat, quum tanta liberalitate, ac diligentia mihi praesto fuerint, et aliquando ultra spem mihi faverint? Porro eadem indulgentia eos me in posterum prosecuturos esse cupio, oro, obtestorque; ut illud demum, quod mihi cordi est, consequar, nempe ut et perfectionis fastigium Hortus Neapolitanus assurgat, feliciter Regnante Principe, cujus auspiciis ejus institutio, et prima incrementa debentur.

Praeter appendicem, de qua supra locuti sumus, aliam addendam duxi, in qua plantas illas quarum sicca specimina in meo herbario existunt enumeravi, quasque in Horto Regio colere hujusque non licuit; tum notas characteristicas, passim observationibus interjectis, novarum specierum a me detectarum exposui; quod quidem eo consilio faciendum curavi, ut ope indicationis plantarum indigenarum, quam nunquam in meo catalogo neglexi, summa plantarum, quae in *Florae Neapolitanae Prodromo* continentur,

facilius innotescat, et facillime indicem tibi consulenti pateat et reperiatur.

Vale, Lector Benevole.

Dabam Neapoli Kalendis Septembris anno 1815.

Michael Tenore,
In Regia Universitate Botanices Professor,
ac Horti Regii Praeses.

AD NOTARUM EXPLICATIONEM APPENDIX.

Biebr. Biebrestein
Bom. Bompland
Desv. Desvaux
Dun. Dunal
Fisch. Fischer
H. Cantab. Hortus Cantabricensis
H. Hal. Hortus Halensis
H. Med. Hortus Mediolanensis
H. Vil. Hortus Vilnensis
H. Vind. Hortus Vindobonensis
L. fil. Linnaei filius
Nois. Noissete
Sebast. Sebastiani
Targ. Targioni
Thuil. Thuillier
Wil. Wildenowii species, in aliis operibus quam in Sp. pl. vel Enum. pl. traditae
* Planta indigena.

AD

CATALOGUM

PLANTARUM

HORTI REGII NEAPOLITANI

APPENDIX PRIMA.

A

Acacia eburnea
juliflora
linifolia
longifolia
lophantha
obliqua
tetragona
Acer montanum
monspessula-
num *
opulifolium
Vill.
pensylvani-
cum
Achillea aegyptiaca
anthemoides

A

Achillea croatica
H. Vind.
flosculosa
lanata
longifolia
H. Vind.
sericea
H. Vind.
serrata
tenuifolia
Achyranthes
porrigens
Acorus gramineus
Adoxa
moschatellina*
Agave foetida

A

Agave lurida
Agrostis dispar
Mich.
serotina *
Aira aquatica *
discolor *Thuil.*
glauca
juncea *Vill.*
praecox *
subspicata
Allium angulosum
atropurpu-
reum
baicalense
danubiale
Schrad.

A

Allium nigrum
obliquum
ramosum
rubens
tataricum
Alnus incana
Alopecurus
nigricans
H. Ber.
Alyssum
gemonense
Amaranthus
incarnatus †
incoruptus
Amaryllis
atamasco
— *var. minor.*
Amyrola nitida
Amomum repens
Amorpha
Ludvisii †
Anarrhinum
bellidifolium
Anchusa
ochroleuca
Ancistrum
latebrosum
Andromeda
axillaris

A

Andromeda
coriacea
humilis †
membranacea
Nois.
nitida
oleaefolia
Nois.
paniculata
polifolia
latifolia
racemosa
ventricosa †
Andropogon
contortum †
provinciale
Andryala
chondrylloïdes
Anemone
nemorosa *
ranunculoi-
des *
Angelica
atropurpurea
verticillaris
Annona
tripetala
Anthemis
coronopifolia

A

Anthemis
ptarmicaefolia
H. Paris.
Triumfetti
All. *
Anthericum
longiscapum
Antholyza cunonia
Anthoxantum
amarum *Brot.*
Apargia
crispa
Apium
petroselinum
— *var. tuberosum.*
Apocynum
venetum
Aquilegia
atropurpurea
viridiflora
Arabis montana
Encycl. *
Aralia spinosa
Arbutus
andrachne
Arctotis
elatior
plantaginea

A A A

Arenaria
laricifolia
setifolia
H. Vind.
Aristolochia
pallida *
pistolochia
Aristotelia
Macqui
Arnopogon
capense
Artemisia
biennis
siversiana
Arundo tenella
Schrad.
Asclepias
carnosa
Asparagus
albus *
amarus *DC.*
aphyllus
officinalis
— *var. maritimus*
Asphodelus
fistulosus
— *var. minor.*

Aster
althaicus
carolinianus
chnensis
— *var. minor.*
lanceolatus
sibiricus
Astragalus
eriocephalus *
Athamantha
condensata
sicula *
Athanasia
trifurcata
Atraphaxis
undulata
Atriplex
microcapa
H. Monsp.
Atropa
frutescens
umbellata
Aucuba
japonica
Avena
elatior *
latifolia
H. Vind.

Avena
Loeflingiana *
nuda
sativa *var. heteromalla*
sempervirens*
Axyris prostrata
Ayenia
pusilla
Azalea
floribunda †
glauca
humilis †
pontica
tomentosa *
viscosa

B

Banksia ilicifolia
praemorsa
prostrata †
Begonia
dichotoma
hirsuta
Berberis sibirica
Betonica orientalis
Thuil.

B

Bidens nivea
Bidens pauciflora
H. Paris.
Bignonia stans
Biscutella
auriculata *
Columnae
Nob. *
Blechnum
boreale *
Borya acuminata
Brassica alpina *
Gravinae
Nob. *
Bromus
agrestis *
commutatus
erectus *
giganteus
grossus *
laxus *W.*
longiflorus *W.*
maximus
Desf. *
purgans
rubens
stipoides
turgidus

B

Bromus villosus
H. Monsp.
volgensis
H. Ber.
Brunia
lanuginosa
Bubon
bucktormense *Spr.*
Budleja globosa
salvifolia

C

Cacalia
Forskalii
H. Monsp.
suaveolens
Cactus
prysmaticus
Desf.
repandus
Caesalpinia
Sappan
Caladium
arborescens
Calceolaria
pinnata

C

Calendula
arragonica
H. Vil.
Campanula
barbata
divergens
lamiifolia *Spr.*
macrostachya
rapunculoides
spathulata
Kit.
Capsicum
gibbosum
H. Monsp.
sinense
Cardamine amara *
sylvatica *
Cardiospermum
corindum
Carduus
carlinaefolius *
lycopifolius
polyanthemos
radiatus
Carex
ampullacea *
extensa *

C C C

Carex Cederi *
ovalis
pallescens *
paniculata *
polystachya *
pseudo-cyperus
punctata *
secalina
stellulata *
umbrosa *
Carthamus
creticus
Cassia Canca
Cathartocarpus
Fistula
Caucalis
humilis *
orientalis
pulcherrima
Celosia
albida
comosa
Celsia
orientalis
Celtis cordata
Tournefortii
Cenchrus
tribuloides

Centaurea
althaica
H. Vind.
argentea
aurea
calocephala
intybacea
macrocephala
peregrina
pratensis *
tatarica
tenuiflora
Biebr.
Vochinensis
H. Vind.
Cerastium
brachypetalum *
Cercis
siliquastrum
— *var. fl. albo*
Cestrum
foetidum
H. Paris.
Chaerophyllum
coloratum *
hybridum
Nob. *

Cheiranthus
angustifolius
DC.
littoreus
taraxacifolius
Chelidonium
hybridum
laciniatum
Chelone
glabra
Chenopodium
chartaginense
Zucc.
crassifolium
Roth.
ficifolium
lanceolatum
opulifolium
Desf.
setigerum *DC.*
villosum
Chloris barbata
ciliata
compressa
DC.
fasciculata
Desf.
pennicillata
scoparia *Lmk.*

C C C

Chloris
squarrosa
H. Monsp.
Chrysanthemum
achilleae
carinatum
graminifolium *
Cichorium
pumilum
Circaea alpina
Cissampelos
smilacina
Cissus antartica
Clematis
flammula *
Clerodendron
fragrans
Cnicus acaulis
cernuus
ciliatus
Cochlearia
danica
Commarum
palustre
Commelina
benghalensis
longicaulis
parviflora *Zea*

Convallaria
verticillata
Convolvulus
batatas
— *var. minor.*
dissectus
evolvuloides
Conyza
carolinensis
patula
verbascifolia *
Corchorus
japonicus
multisiliquosus
Coreopsis
chrysantha
diversifolia
verticillata
Cornus alba
mascula
fr. luteo
Coronilla
cretica
picta
vaginalis *
Corylus colurna
Cotyledon
Jussiaei †

Crambe
cordifolia †
maritima
Crassula
flava
Crataegus
latifolia *Lmk*
racemosa *Lmk*
Crepis bannatica
biennis *
lacera *Nob.* *
lappacea
latifolia
leontodontoides
raphanifolia
W.
rigida
rubra
— *var. minor.*
taraxacifolia
Crotalaria
orientalis
H. Viln.
purpurascens
Crucianella
molluginoides
Crypsis
schoenoïdes

Cucubalus
acyncides
H. Paris.
Curcuma longa
Cyclamen
persicum
Cynanchum
erectum
Cynoglossum
angustifolium
bicolor
magellense
Nob. *
Cynosurus
cristatus
— *var. aristis violac.* *
Cyperus
acutiusculus †
alternifolius
esculentus
ligularis
mucronatus
spectabilis
Schrad.
tetrastachyos *
Cytisus
Laburnum
latifolius

Cytisus
paniculatus
Kit.

D

Dactylis
glaucescens *
Dalechampia
scandens
Daphne Gnidium
pontica
sinensis †
Datisca
cannabina
Datura
ceratocaula
Daucus
lucidus.
Delphinium
anomalum †
azureum
grandiflorum
hybridum
revolutum
H. Paris.
urceolatum
Dianthus
alpestris

Dianthus
attenuatus
bicolor *Biebr.*
caesius
capitatus
glaucus
hortensis
libanotis
petraeus
ochroleucus
ruthenicus
H. Hal.Flal.
Digitalis lanata
obscura
Rothii*H.Vind.*
Digitaria ciliaris
Dillenia scandens
Diosma
imbricata
Dipsacus
ferox *Lois.*
Disodium
divaricatum
Dolichos
lablab
—*var.fr. albo*
odoratus †
Dorycnium
monspeliense

Dracoena Draco

E

Echinops
paniculatus
Jacq. fil.
Echium
candicans
densiflorum
DC.
giganteum
parviflorum *
Ehretia
Bourreria
Eleusine
filiformis
Elymus
geniculatus
giganteus
glaucifolius
mexicanus
H. Vind.
tener
Epilobium
coloratum
origanifolium
Equisetum
sylvaticum *

Erianthus
saccharoides
Erigeron
phyladelphicum
uniflorum
Eriophorum
polystachyum *
Erodium
maritimum
pimpinellifolium *
Ervum lentoides
Nob. *
Eryngium
aquaticum
corniculatum
dichotomum
oliverianum
Laroche
Erysimum
arenatum
Vincens
Erythryna
speciosa
H. R. Cas.
Eucalyptus
resinifera

Eugenia
jambos
Eupatorium
altissimum
Euphorbia
androsemifolia
H. Vind.
dendroides *
heptagona
juncea
paniculata *
prunifolia
W. enum.
thymifolia
tithymaloides
myrtifolia
padifolia
valentina
Evonymus
europaeus
fr. albo

F

Fabricia laevigata
Fagonia
cretica
Ferula ferulago
nodiflora *

F F H

Festuca
alopecurus *
Pers. ciliata fl. Fr.
aquatica *Bosc*
caespitosa *Desf.* *
calycina
capillata *
ciliata *Pers.*
decumbens *
diandra
geniculata
pratensis *
pumila *Schrad.* *
rubra *
spadicea *
tenella *
tenuifolia
varia *Schrad.* *
Ficus stipulata
Fragaria
collina *
Fraxinus
excelsior
— *var. parvifolia*
juglandifolia
Fraxinus
lentiscifolia

G

Galega
ochroleuca
orientalis
Galium
adhaerens *H. Vind.*
anglicum *
angulosum *H. Paris*
villosum
Gardenia
florida *fl. pleno*
Gaultheria
procumbens
Genista
decumbens *
Geranium
bohemicum
nemorosum *Nob.* *
Geum
intermedium
macrophyllum
Geum reptans
Gleditschia
triacanthos
laevis
Globularia
longifolia
Gloxinia maculata
Glycine frutescens
precatoria
sarmentosa
Gnidia simplex
Gomphraena
brasiliensis
Goodenia ovata
Gorteria pectinata
Gypsophyla
perfoliata

H

Hakea pectinata †
pugioniformis
Halleria lucida
Harrachia
speciosa *Jacq.*
Hasselquistia
cordata
Hedypnois
arenaria

H

Hedypnois
maritima
H. Vind.
Hedysarum
junceum
Helianthemum
canum
umbellatum
Helianthus
atrorubens
flexuosus
H. Vind.
Heracleum
angustifolium
Hermannia scabra
Heuchera
americana
Hibiscus
Bamia *Targ.*
hispidulus
H. Bon.
Moscheutos
phyladelphicus *H. Paris.*
speciosus
Trionum *
ternatus
Hieracium
amplexicaule

H

Hieracium
fallax
glaucum
humile *
integrifolium
Lawsonii
paludosum *
pseudo-pilosella *Nob.* *
ramosum
Sabinum
Sebast. *
Holcus
bulbosus
Hydrangea
arborescens
Hydrocotyle
spananthe
Hydrophyllum
magellanicum
Hyoseris
hedypnoides
Lin. Fil.
muricata
Hypericum
Kalmianum
Hypochœris
arachnoides
Desf.

H

Hypochœris
hirta
hispida
Hypoxis alba

I

Jasminum
gracile
humile
Sambac *fl. pl.*
Jatropha Curcas
Iberis carnosa *
Ilex myrtifolia
Illecebrum sessile
Indigofera
caroliniana
madagascariensis
H. Paris.
Inula bifrons
suaveolens
Ipomaea luteola
Iresine
celosioides
Iris lutescens
variegata
Juncus
acuminatus

I	K	L
Juncus	Kyllinga	Leptospermum
compactus	incompleta	arachnoideum
Hop. *	umbellata	lanigerum
Forsteri		squarrosum
Smith *	L	*Desf.*
glaucus *		tomentosum †
Justicia	Lactuca crispa	Ligusticum
paniculata	intybacea	scoticum
Ixia bulbifera	palmata	sibiricum
hyalina	perennis *	Linaria acutangula
lancea	stricta	*Nob.* *
squalida	Lantana nivea	hirta
villosa	salvifolia	glauca
Ixora	Lapsana crispa	origanifolia
crocata	lyrata	supina
	Laserpitium	tristis
K	gallicum	Linum
	pilosum	aegyptia-
Kaempferia	silaifolium *	cum †
Galanga	Lathyrus	austriacum
Kalmia	latifolius	Lippia rubra
angustifolia	Laurus benzoin	*H. Mediol.*
glauca	Leontodon	Lobelia fulgens
latifolia	serotinus	laurentia
Koeleria	Lepidium	splendens
albescens	latifolium	Lolium asperum
DC. *	spinosum	*H. Berol.*
hispida *Id.* *	Leptospermum	Lonicera Diervilla
tuberosa *	ambiguum	nigra

M

Monarda
punctata
Musa coccinea
Myagrum
hyspanicum
sativum
Myosotis
squarrosa
Myrica cordifolia

N

Napaea laevis
Narcissus
incomparabilis
Nepeta hirta †
Mussini
H. Viln.
Nicotiana
angustifolia
Nerium odorum
— *var. pumilum*

O

Ocymum
anisatum
H. Viln.
Ocymum
hirtum
Encycl.
thyrsiflorum
Oenanthe
parviflora
H. Paris.
Oenothera
fruticosa
grandiflora
sinuata
Ononis hircina
hispanica
inclusa *Poir.*
mollis *Savi* *
pinguis
olygophylla
Nob. *
Onopordon
tauricum
Ophrys
ovata *
Orchis
latifolia *
simia *
Origanum
aegyptiacum
humile *Desf.*
onites
Ornithogalum
coarctatum
Orobus
angustifolius
niger
varius
venetus
H. Bon.
Oxalis asinina
flava

P

Pancratium
declinatum
illyricum
Panicum capillare
crus-corvi
divaricatum
echinatum
geniculatum
germanicum
repens *
sibiricum
virgatum
Papaver
cambricum
Paspalum
tenellum

P

Passiflora alata
foetida
minima
pedata
Pelargonium
adulterinum
angulosum
canum
cordatum
elegans
formosissimum
myrrhifolium
ribifolium
speciosum
D. Cours.
therebinthinaceum
Peltaria
alliacea *
Peucedanum
tauricum
H. Paris.
Phaca
reptans
H. Paris.
Phalangium
milleflorum
ramosum

P

Phalaris minor
Phaseolus
incanus †
saponaceus
H. Paris.
sophia
H. Paris.
Phleum
Bellardi
echinatum
Host
Hostii
Michelii
Phlomis
aspera
indica
laciniata
Phlox divaricata
paniculata
— *var. fl. albo*
Phormium tenax
Phylica
buxifolia
ericoides
Physalis
barbadensis
foetens
Bompl.
tuberosa

P

Picris pauciflora
Pimpinella dioica
Pinus Abies
coerulea
australis †
balsamea
brutius *Nob.**
canadensis
Laricio *
Larix
mitis *Noisette*
nigra
rubra
Piper
Clusiaefolium
H. Bon.
non. Will.
obtusifolium
pereskiaefolium
Pittosporum
undulatum
Plantago asiatica
Murray
depressa
Will.
hirsuta
H. Monsp.
montana *

P

Plantago saxatilis *H. Berol.*
serpentina
squarrosa
vaginata
victorialis
villosa *Pers.*
Plectranthus punctatus
Poa amabilis *Zea*
badensis
caesia *Smith*
distichophylla *Host*
festucaeformis
laxa
laeta *Will.*
sudetica
tenella
Podalyria australis
Podophyllum peltatum
Polygala flavescens *DC.* *
Polemonium coeruleum
— *var. fl. albo*

P

Polemonium gracile *H. Berol.*
Polygonum Bellardi *
Pontederia cordata
Potentilla inclinata
laciniata *Kit.*
ruthenica
sericea
supina
Poterium polygamum
Praenanthes japonica
Prunus cocomilia *Nob.* *
dasycarpa
mahaleb
fr. flavo
Psidium montanum
Psoralea corylifolia
hyrta
lathyrifolia *Balb.*

P

Psoralea tenuifolia
Pulmonaria angustifolia *
Pyrethrum bipinnatum
pinnatifidum
pulverulentum *Will. enum. non Pers.*
Pyrus amelanchier

Q

Quercus conglomerata *
fastigiata
Frainetto *Nob.*
haliphleos *
pubescens *
robur
— *var. lanuginosa*

R

Ranunculus abortivus

R	R	R
Ranunculus	Robinia	Ruta
brevifolius	agapantha †	angustifolia
Nob. *	althagana	
flabellatus *	Rosa alpina	S
nodiflorus *	glauca	
tuberculatus	*H. Paris.*	Salix riparia
Kit.	montana *	triandra
Rhagadiolus	pendulina	Salsola rosacea
Koelpinia	portlandica †	sedoides
lapsanoides	villosa	Salvia
H. Paris.	Rubia	amplexicaulis
Rhamnus	cordifolia	austriaca
Frangula	Rubus	bullata *Vahl*
Rheum	hirtus *	campestris
hybridum	odoratus	Forskalei
Rhinanthus	Rudbeckia	hirsuta
hirsuta	digitata	illyrica *Brot.*
Lmk. *	Ruellia	lanigera
Rhododendron	clandestina	*H. Paris.*
maximum	paniculata	nutans
album	pubescens	oblongata
roseum	*H. Vind.*	*Vahl*
rubrum	strepens	— *var. fl. rubro*
ponticum	Rumex confertus	odorata
Ricinus	crispus	patula
africanus	divaricatus	pulchella *DC.*
Rivina	nemorosus	scabiosaefolia
purpura-	undulatus	Spielmanni
scens	*H. Paris.*	sylvestris

S

Salvia truncata
variegata
Sambucus nigra
— *var. fr. albo*
Sanseverinia
carnea
Santolina
crithmifolia
Will.
Saponaria
orientalis
Satureja
filiformis *
Saxifraga
aizoides
longifolia
Sternb.
Scabiosa agrestis
alpina
caucasica
centauroides
dichotoma
graminifolia *
hybrida *Vit.*
laevigata *Kit.*
laxiflora *Will.*
palaestina
rutaefolia *
sicula

S

Scabiosa tatarica
ucranica
Scirpus
baeothryon
— *var. campestris* *
machrostachys *
Scorzonera
angustifolia
coronopifolia *
octangularis
parviflora
purpurea
stricta *Horn.*
Scrophularia
biserrata
grandidentata
Nob. *
mellifera
sambucifolia
Scutellaria
albida
integrifolia
lateriflora
minor
Sedum
atratum *
repens *

S

Sedum villosum
— *var. hirsutum* *
Selinum
Carvifolia
elegans *Balb.*
Senecio
delphinifolius *
reclinatus
rupestris *
Seriola
taraxacoides
Lois. *
Serratula
lyrata *Spr.*
pinnatifida
H. Paris.
pulchella
Fisch.
Sesamum
indicum
Seseli gracile
hippomarathrum *
Pallasia
H. Cantabr.
Sesleria cylindrica
Balb. *

S S S

S

Sonchus
pensylvanicus
Spr.
Sophora
microphylla
tetraptera
Sorbus hybrida
Sparmannia
africana
Spartium
sphaerocar-
pum
Spermacoce
tenuior
Spilanthus
acmella
fusca
Spiraea
Aruncus
crenata
Stachys
glutinosa
scordifolia
Will.
Stapelia
asterias
bisulca *Jacq.*
bufonia
deflexa *Jacq.*

S

Stapelia
geminata
glauca
grandiflora
marmorata
Jacq.
normalis
Jacq.
planiflora
radiata
Statice
alpina *
auriculaefolia
latifolia
mucronata
plantaginea
scorzoneraefo-
lia
spathulata
Staavia
ivaefolia
linearis
ovata
Stipa
tortilis *
Symphytum
bullatum
Horn.
tauricum

T

Tanacetum
annuum
Teucrium
regium
Thapsia villosa
Thalictrum
concinnum
Cornuti
discolor
H. Monsp.
nigricans
rugosum
sibiricum
Thea
Bohea
Thrincia
hispida
Thymbra
ciliata *
Thymus
marifolius
Tiarella
cordifolia
Tilia
alba
Tournefortia
foetidissima
hirsutissima
volubilis

APPENDIX
PLANTARUM
FLORAE NEAPOLITANAE
QUAE NONDUM
IN HORTO REGIO COLUNTUR.

A

Acer
obtusatum
Achillea
alpina
Adonis
apennina ?
Agrostis
arundinacea
canina
plumosa *Nob.*
Aira alpina
coerulea
Ajuga
pyramidalis
Allium
moschatum

A

Allium
trifoliatum
Cyr.
victoriale
Alopecurus
geniculatus
Alyssum
alpestre
cuneifolium
Nob.
orientale
Ambrosinia
Bassii
Anabasis
tamariscifolia
Anagallis Monelli

A

Androsace carnea
Anemone alpina
Anthyllis hirsuta
Arenaria
grandiflora
uliginosa *DC.*
Aronia
rotundifolia
Artemisia
abrotanum
maritima
Aspidium
spinulosum
Astragalus alpinus
Athamantha
Matthioli

A

Atriplex
laciniata
— *var. sinuata*
veneta
Avena
pubescens

B

Brassica
hispida
Bromus
multiflorus
leptostachyos
ramosus
Bryonia
alba
Buccaferrea
cirrhosa *Pet.*
Bunium
bulbocastanum
— *var. minus*
Bupleurum
junceum
rotundifolium
— *var. longifolium*

C

Cachrys laevigata
Callitriche
dioica *Pet.*
Campanula
glabra
Cardamine
pratensis
Carduus
cyanoides
Carex
acuta
collina
depauperata
nigra
schoenoides
Centaurea
napifolia
Centunculus
minimus
Cerastium
grandiflorum
longifolium
Nob.
ovale *Pers.*
Ceterach
Maranthae
Chaerophyllum
bulbosum

C

Chara flexilis
hispida
Chenopodium
maritimum
Chlora
imperfoliata
Chrysanthemum
italicum
Chrysosplenium
oppositifolium
Cnicus pauciflorus
Coris
monspeliensis
Coronilla juncea
Cucubalus
pumilio
Cynanchum
monspeliacum
Cyperus pulcher

D

Delphinium
peregrinum
— *var. fol. tomentosis*
Dianthus
alpinus

D

Digitalis
parviflora
Lmk.
Doronicum
althaicum

E

Epilobium
montanum
— *var. alpestre*
Equisetum
pratense
ramosum
variegatum
Erica
mediterranea
scoparia
umbellata
Erinus alpinus
Euphorbia
denticulata
Pers.
epithymoides
exigua
— *var. diffusa*
Isatis *Pers.*

E

Euphorbia
provincialis
Euphrasia
pectinata *Nob.*

F

Festuca
coerulescens
maritima
Fl. Fr.
valesiaca
Gaud.
Fraxinus
angustifolia

G

Galium rubrum
Genista
lusitanica
Gentiana
grandiflora
— *var. alpina*
Pneumonanthe
utriculosa
verna

G

Geranium
lividum
Geum
montanum
rivale
Glaux maritima

H

Hedypnois
rhagadioloides
Helianthemum
tuberaria
Heracleum
lanatum
Hieracium
angustifolium
auricula
chondrylloides
saxatile
Holosteum
umbellatum
Hypericum
fimbriatum

I

Iberis sempervirens

R

Ranunculus
alpestris
napellifolius
Crantz
rutaefolius
Rhotia
andryaloides
runcinata
Rosa saepium
Thuil.
Rubia
peregrina
Ruppia
maritima

S

Salix Croweana
Salvia
pyramidalis
Pet.
Saxifraga
autumnalis
Burseriana
mixta *Pers.*
pyramidalis
Scabiosa
pterocephala
succisa
— *var. hirsuta*
Scilla italica
Scirpus
mariscus
— *var.*
Michelianus
Senecio
saracenicus
Spartium
radiatum
Stellaria
alpina
graminea

T

Thesium
ramosum
Thymus
patavinus
Trifolium
alpinum
Tulipa
Celsiana
Redoutè

V

Viola
mirabilis
Viscum
album

Z

Zostera
marina

SYNOPSIS

NOVARUM PLANTARUM,

QUAE IN PRODROMO

FLORAE NEAPOLITANAE,

ANNO 1811-13 EDITO, DESCRIBUNTUR.

1. *Veronica Buxbaumii.* Floribus solitariis pedunculatis, foliis profunde crenatis hirsutis, corollis calyce longioribus, pedunculis fructificantibus, cernuis, capsulis obreniformibus, dilatatis compressis acutis ciliatis, calyce longioribus. Annua. *Flor. Neap. Prodr. pag. VI. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 7. *tav. I. Buxb. cent.* 1. *tab.* 40. *f.* 2.

Habitat ad agrorum margines.

In Buxbaumii cent. 1. pag. 25. tab. XL. duae extant icoues, quarum prima ad *Veronicam filiformen* pertinet, altera ad nostram speciem; simplicique intuitu facile harum specierum differentiam agnoscitur. In *Veronicae filiformis* descriptione, ex Encyclopedia tom. 8. pag. 538., et ex Vahl enum. pl. vol. 1. p. 82. num. 63., folia dicuntur minuta subrotundo-cordata, laeviter crenata, pilis raris adspersa, lente tantum conspiciendis; pedunculi longissimi, calycis laciniae lanceolatae, capsulaeque obcordatae. At in nostra

specie folia sunt quadriuncialia et ultra, ovalia profunde dentata, dentibus crenatis, hirsuta; pedunculi vix duplo foliis longiores, calycis laciniae ovatae, corollae lobi rotundati obtusi et capsulae reniformes dilatatae. Ipse Buxbaumius loco citato in veronicae nostrae descriptione monet sequentia « *haec species floribus eleganter coeruleis striatis, caulibus erectioribus, a minore* (filiformi) *differt.* »

2. *Ixia purpurascens.* Scapis unifloris; foliis linearibus canaliculatis, angulatis, rigidis, erectis, longissimis; corollis purpureis, petalis tribus externis, externe viridibus, fusco-lineatis. Perennis. *Flor. Nap. vol.* 1. *pag.* 13. *tav.* 2.

In hortis colitur.

3. *Cyperus aureus.* Culmo triquetro nudo, foliis lanceolatis, canaliculatis, revolutis, lacte-virentibus, umbella decomposita erecta, spicis linearibus fasciculatis, aureo-lutescentibus, radice tuberosa, repente. Perennis. *Fl. Neap. Prodr. pag. VIII.*

Habitat in arvis prope Neapolim.

4. *Phalaris Barrelieri.* Panicula cylindrica spiciformi; glumis calycinis divaricatis planis, ovato-ciliatis, argenteis, corollarum valvis interioribus bidendatis; foliis pilosis. Annua. *Fl. Neap. Prodr. pag. VIII.*

Habitat ad litora Insulae Inarimes.

5. *Festuca Barrelieri.* Spica simplici disticha, spiculis subsessilibus 20-floris remotis muticis. Annua. *Fl. Neap. Prodr. pag. IX.*

Habitat in antiqua Lucania hodie Basilicata.

A *Bromo ramoso* differt panicula compacta simplici, noc effusa ac ramosa, foliis glabris non asperis hispidisque, denique toto habitu. A *Festuca caespitosa* differt, foliis lanceolatis planis, non capillaribus et convolutis, culmo erecto, superne folioso non nutante aphyllo.

6. *Bromus Scaberrimus.* Panicula aperta pedunculis erectis verticillatis, elongatis simplicibus, ramosisque; locutis 12-floris hispidis scaberrimis fuscis, aristis glumarum longitudine; foliis villosis. Annuus. Fl. Neap. Prodr. pag. X.

Habitat in pascuis siccis Montis Virginis in Principatu Ulteriori.

7. *Bromus jubatus.* Panicula aperta laxa, pedunculis longissimis verticillatis, capillaribus, horizontalibus pendulisque, locustis 5-7 floris; glumis glabris, aristis glumis duplo longioribus; foliis glabris. Annuus. *Ibidem.*

Habitat cum praecedente.

A *B. maximo* desf. differt panicula laxa, pedunculisque capillaribus longissimis effusis.

8. *Sesleria nitida.* Spica ovata, spiculis quadrifloris nitidis mucronatis, corollis coeruleis; floribus vaginantibus obtusis glabris, caulinis brevioribus. Perennis. Fl. Neap. Prod. pag. X.

Habitat in pascuis siccis Montis Cerealti, in Principatu Ulteriori.

9. *Agrostis plumosa.* Panicula contracta subspicata flexuosa, calycibus muticis obtusiusculis, undique plumoso-sericeis; foliis involutis rigidis, cul-

mo ramoso, basi infracto. Annua. Fl. Neap. Pr. sup. I. pag. LIX.

Habitat in Calabria Ulteriori prope Rhegium.

10. *Rotboella spathacea.* Spicis axillaribus fasciculatis pedunculatis, basi vaginis spathaceis cinctis; spica recta compressa subulata, flosculis bifariis adpressis; glumis calycinis binis acutis; foliis conduplicatis glabris, caule humifuso. Perennis. Fl. Neap. Prod. pag. XI.

Habitat in pascuis humidis prope Neapolim, in locis, vulgo dictis: *Pascone, Bagnoli*, etc.

R. fasciculata desf. habet caulem constanter erectum.

11. *Hakea lanigera.* Caule arboreo, ramis verticillatis adscendentibus, junioribus lanatis, foliis confertis sparsis teretibus, rigidis mucronatis glaucis, pilis deciduis indutis, petalis subglabris, capsulis pyriformibus rostro bicorne. Fl. Nap. vol. 1. p. 22. tav. VI.

Habitat ad Novam Hollandiam; colitur in Horto Regio.

Hakea pubescens habet ramos cernuos. *H. sericea* habet folia glabra.

12. *Globularia bellidifolia.* Caule fruticoso repente, foliis spathulato-cuneiformibus, crenatis; scapo nudo; capitulo terminali. Peren. Fl. Neap. Prod. pag. XI.

Habitat in Monte Magella Aprutii Citerioris.

Species intermedia inter *S. nudicaulem*, et *vulgarem*; a *nudicaule* differt foliis cuneiformibus

dentatis; a *vulgari* caule procumbente aphyllo; Ad *G. cordifoliam* tamen accedere videtur, at in nostra planta folia sunt in ambitu crenata, nec tantum tridentata.

13. *Scabiosa ceratophylla*. Caule fistuloso villoso; foliis radicalibus lyratis, crenatis, caulinis bipinnatifidis, laciniis linearibus falcatis; calycibus discum aequantibus; seminibus 5-radiatis. Biennis. Fl. Neap. Prod. pag. XII. Fl. Nap. vol. 1. p. 31. tav. 8.

Habitat in nemoribus Aprutii.

14. *Columnae*. Caule fistuloso hirsuto; foliis radicalibus obovatis, lyratisque, crenatis; caulinis pinnatifidis, laciniis cuneiformibus incisis, hirsutis; capitulo globoso; corollis quinquefidis radiantibus, seminibus 3-5-radiatis. Biennis. Fl. Neap. Prod. pag. XII. Fl. Nap. vol. 1. pag. 29. tav. 7.

Habitat undique secus vias.

15. *Asperula tomentosa*. Caule basi suffruticoso, procumbente, foliis quaternis, subcarnosis, inferioribus ellipticis, superioribus linearibus obtusis revolutis; floribus subquaternis aristatis. Planta tomentosa. Perennis. Fl. Neap. Prod. pag. XII. Fl. Nap. vol. 1. pag. 34. tav. 9.

Habitat in rupibus calcareis Insulae Caprearum.

16. *Plantago eriostachya*. Foliis lanceolatis quinquenerviis denticulatis pilosis, basi dense-lanatis, scapis angulatis, spicis ovatis lanatis. Annua. Fl. Neap. Pr. pag. XIII.

Habitat in arvis undique.

17. *Plantago brutia*. Foliis ovatis septemnerviis,

remote profundeque dentatis, scapo angulato, spica ovato-oblonga compacta glabra, bracteis calycibusque virescentibus. Perenn. Flor. Neap. Prod. sup. 1. pag. LIX.

Habitat in monte Pollino Calabriae Citerioris.

18. *Anchusa hybrida.* Foliis oblongo-lanceolatis sinuato-dentatis, undulatis, racemis confertis bipartitis, calycibus quinquefidis obtusis, fructiferis inflatis cernuis, corolla clausa squamis brevibus obtusis. Planta villoso-hispida. *Buglossum syl. min. Bauh. pin.* 256. Ann. Fl. Neap. Prod. pag. XIV. Fl. Nap. vol. 1. pag. 45. t. XI.

Habitat prope Neapolim secus vias.

Ab *A. Officinali* differt foliis oblongo-lanceolatis undulatis, ab *A. undulata*, foliis minime strigosis, latioribus obtusis, basi amplexicaulibus; ab *A. angustifolia*, calycibus inflatis laciniis obtusiusculis.

19. *Echium prostratum.* Caule herbaceo procumbente ramosissimo strigoso, foliis radicalibus, caulinisque ellipticis petiolatis tuberculoso-hispidis, corollis calycibus duplo longioribus, staminibus corolla duplo brevioribus, calycibus fructificantibus inflatis. Annuum. Fl. Neap. Prod. pag. XIV. Fl. Nap. vol. 1. pag. 50. t. XII.

Habitat in Insula Caprearum.

Cl. Vivianius (Fl. Ital. fragm. fasc. 1. p. 2. tav. 4.) novam *Echii* speciem describit, sub nomine *E. calycini;* in sua icone ramulum tantum hujus plantae raepraesentatur quae ad nostram plurimum accedere videtur, sed Echii calycini descriptio et

synonima meae plantae minime accomodantur. In illo nempe caulis adscendens basi ramosus, foliaque oblonga acuta indicantur; dum noster caules plures prodest humifusi, apice tantum ramosi foliaque elliptica et obtusa. Tilli synonimon: *E. annuum folio lithospermi arvensis, flore coeruleo parvo* Hort. pis. pag. 56. tav. 23. f. 3. a Cl. Vivianio sub suo *echio* refertum, *echio parvifloro Rot.* potius pertinere videtur. In ipso revera corollae calycibus subaequantibus, caulisque erectus observantur. Synonimon *Buglossum scorpioides hirsutum flore coeruleo.* Bocc. *Mus.* p. 163. tab. 130. et *Barrel. observat.* 141. tab. 403. ob folia sinuata et corollarum formam, nullomodo ad *Echium calycinum* referri potest, sed potius ad meam *Anchusam hybridam* amandandum.

20. *Lithospermum rosmarinifolium.* Fruticosum; foliis linearibus margine revolutis, supra glabriusculis, pilis raris adpressis lente conspicuis, subtus incanis; corollis calycibus triplo majoribus, staminibus tubo corollae subaequantibus. Flor. Nap. Prodr. sup. II. pag. LXV.

Habitat in Insula Caprearum inter fissuras rupium.

A *fruticoso* differt caule elatiore 3 pedali et ultra, foliis latioribus subglabris, nec pilis erectis utrinque hispidis.

21. *Cynoglossum magellense.* Foliis lineari-lanceolatis, inferioribus sessilibus, superioribus basi amplexicaulibus latioribus, utrinque villoso-lanatis; racemis cernuis compactis; calycibus 5-par-

tatis, laciniis linearibus dense lanatis, corollis calycibus subaequantibus, limbo 5-fido, lobis rotundatis, seminibus membranaceis, centro et margine muricatis. Peren. Fl. Neap. Prod. sup. II. pag. LXVI.

Habitat in Magella.

A *Cynoglosso lanato*, cui affine, differt stylo corolla breviore, laciniis rotundatis, foliis caulinis radicalibus aequantibus, aliisque notis.

22. *Primula Columnae.* Foliis obovatis dentatis villosis, rugosis, petiolis alatis, corollis longitudine calycis, tubi collo cylindrico, scapo centrali multifloro. *Paralytica rotundifolia montana. Columnn. ecphras. par. 1. p. 156. cum ic. Fl. Nap. Prod. p. XIV. Fl. Nap. vol. 1. p. 54. t. XIII.*

Habitat in pascuis Montium Aprutii.

A *P. officinali* differt corolla limbo latiori planiusculo, lobis emarginatis, margine integerrimis, nec corolla limbo brevi concavo, laciniis margine crenatis, foliis petiolatis ovato-cordatis subtus tomentosis.

A *P. elatiori* differt tubo corollae cylindrico, non haemisphaerico, calycibus corollis subaequantibus, nec corollis triplo brevioribus.

23. *Convolvulus hirsutus.* Caule volubili hirsuto; foliis radicalibus cordatis rugosis repandis, dentatis, caulinis palmato-incisis, hirsutis, pedunculis bifloris. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. p. XV. Fl. Nap. vol. 1. p. 60. t. XV.*

Habitat in saepibus Bajarum prope Puteolos, et in Insula Caprearum

A *C. altheoide* differt toto habitu, caule volubili per saepes mirum procurrenti, hirsutie holosericea, colore atrovirenti totius plantae, minime albo-tomentosa. Cultura non immutatur.

24. *Campanula trichocalycina*. Caule simplici basi hirsuto, foliis subsessilibus ellipticis, grosse remoteque serratis; dentibus apice setaceis, racemo terminali subsimplici, floribus breviter pedunculatis, calycinis laciniis capillaribus longissimis. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. p. XVI. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 67. *t. XVI.*

Habitat in sylvis montis Cerealti, et Pollini Calabr. Citer.

25. *Campanula obliquifolia*. Hirsuta, caule simplici erecto, foliis radicalibus oblongis, basi oblique-cordatis, repandis, bicrenatis, petiolis alato-membranaceis, caulinis amplexicaulibus, petiolis late alatis; racemis paniculatis secundis. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. p. XV. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 69. *t. XVII.*

Habitat in nemoribus montis Magellae.

Forsan Camp. bononiensis *var.*, sed in nostra planta folia radicalia sunt longe petiolata, obliqua, et calyx omnino glaber.

26. *Campanula foliosa*. Hirsuta, caule angulato simplici, foliis omnibus petiolatis ovatis bidentatis, petiolis alatis, floribus sessilibus capitato-glomeratis, involucri foliis ovato-cordatis latissimis. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. XVI. Fl. Nap. vol. 1. p.* 71. *tav. XVIII. Trachelium alpinum, flo-*

ribus conglomeratis, foliis Asarinae rigidis et hirsutis. Herm. par. 235. tab. 235.

Habitat in sylvis Montis Virginis et Magellae.

A *Camp. glomerata* differt foliis ovato-cordatis, petiolis alatis, foliis floralibus ovato-cordatis latissimis, floribus intrafoliaceis, interrupte-spicatis.

27. *Prismatocarpus hirtus.* Caule erecto, ramis patentibus subtrifloris, foliis oblongis subcrenatis obtusis, corollis calycibus aequantibus. Annuus. *Flor. Nap. Prodr. p. XVI. Fl. Nap. vol. 1. p. 76. tav. XIX.*

Habitat in agris undique.

A *P. speculo* differt hirsutie totius plantae, caule erecto, calycibus corolla brevioribus.

28. *Prismatocarpus falcatus.* Laevis; caule erecto simplicissimo, foliis obovatis pubescentibus subcrenatis, floribus axillaribus sessilibus, corollis calycibus duplo-brevioribus, laciniis falcatis acuminatis. Annuus. *Fl. Nap. Prodr. p. XVI. Flor. Nap. vol. 1. p. 77. t. XX.*

Habitat in collibus umbrosis *Agnani* prope Neapolim.

29. *Verbascum niveum.* Foliis radicalibus petiolatis, obovato-cuneatis, caulinis amplexicaulibus ellipticis, crenatis, utrinque tomentosis; spica simplici compacta, filamentis barbatis, pilis albis. Tota planta niveo tomento induta. Bienne. *Fl. Nap. Prodr. p. XVI. Fl. Nap. vol. 1. p. 90, tav. XXII.*

Habitat in pascuis montium Lucaniae.

A *V. Lychniti*, cui affine, differt spica simplici floribus sessilibus, a *V. phlomoidi*, spica simplici compacta nec ramosa interrupte-racemosa.

30. *Verbascum longifolium.* Foliis oblongo-lanceolatis integerrimis, radicalibus longissimis subpetiolatis, caulinis amplexicaulibus, subtus tomento densissimo albicante, supra tomento flocoso secedente luteo-aureo, indutis; spica subramosa dense lanata. Bienne. *Fl. Nap. Pr. p. XVI.*

Habitat in pascuis montium Aprutii.

Verbascum montanum tomentosum longifolium, luteum, foliis non serratis, flore parvo, caule rotundo. D. Michelii. *Till. Hort. Pisan.* pag. 171. *Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 89. *t. XXI.*

31. *Verbascum rotundifolium.* Foliis radicalibus longe petiolatis subrotundis, caulinis inferioribus ovalibus petiolatis summis amplexicaulibus, omnibus crenatis undulatis, tomento cinereo utrinque indutis, spica interrupta subracemosa, basi subramosa. Bienne. *Fl. Nap. Prodr. sup. II. pag. LXVI. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 92. *tav. XXIII. Verbascum tomentosum et incanum, folio subrotundo, et quasi circinato, caule non alato, flore luteo, staminulis purpureis, fructu longiore. D. Micheli Till. Hort. Pis. p.* 171.

Habitat in collibus Amalphitanis, et in Insula Caprearum.

32. *Verbascum angustifolium.* Foliis inferioribus petiolatis lanceolatis crenulatis, superioribus amplexicaulibus ovato-oblongis; spica simplici compacta, filamentis pilis albis barbatis. Planta peda-

lis; tomento floccoso albicante induta. Bienne. *Fl. Nap. Prodr. sup. II. p. LXVI.*

Habitat in pratis siccis Nicoterae Calabriae Citerioris.

33. *Cyclamen neapolitanum.* Foliis ovato-cordatis angulatis crenatis, petalis ovatis obtusis; radice maxima rapacea. Floret autumno. Perenne. *Fl. Nap. ibidem.*

Cyclaminus inodoro purpurascente flor. Clus. hist. 1. *pag.* 265. *ic.*

Habitat in sylvis, undique commune.

34. *Hyoscyamus auriculatus.* Caule erecto simplici, foliis ovatis petiolatis sinuatis acutis, petiolis alatis, basi auriculatis; floribus subsessilibus corollis luteis, fundo venis purpureis reticulatis. Annuus. *Fl. Nap. Prodr. p. XVI.*

Habitat in arvis Abellini.

35. *Rhamnus pusillus.* Inermis, repens, floribus dioicis, foliis obovato-cuneatis ultra medium crenulatis apice mucronatis. Frutex. *Fl. Nap. Prodr. p. XVI.*

Habitat in rupibus calcareis montis Magellae.

36. *Bupleurum trifidum.* Caule erecto 4-pedali ramoso, foliis lanceolatis 9-nerviis, summis falcatis; involucris triphyllis brevissimis lineari-subulatis, involucellis pentaphyllis setaceis, umbellis trifidis, brevioribus. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. p. XVIII.*

Habitat in saepibus siccis Principatus Ulterioris.

37. *Bupleurum cernuum.* Caule erecto simplici, foliis linearibus obtusis, basi angustioribus, subpe-

tiolatis; involucris subtriphyllis lanceolatis, involucellisque pentaphyllis setaceis, umbellis 5-fidis, radiis capillaribus longissimis, brevioribus. Peren. *Fl. Nap. Prodr. p. XVIII.*

Habitat in rupibus calcareis Montis Virginis, et Matesii.

38. *Cachrys sphaerocarpa.* Foliis supra decompositis setaceis multifidis subinermibus, fructibus subrotundis sulcatis laevibus. Perenne. *Fl. Nap. Pr. p. XIX.*

Habitat in pascuis siccis Insulae Caprearum.

39. *Ligusticum garganicum.* Foliis bipinnatis foliis oblique-ovatis, coriacees venosis, glabris, margine cartilagineis, integerrimis, simplicibus, vel profunde tripartitis, involucro universali foliolis plurimis membranaceis, seminibus glabris. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. p. XIX. Fl. Nap. vol. 1. p. 122. t. XXIV. Ligusticum Garganicum amplis foliorum lobis D. Micheli Till. Hort. Pis. tav. 39. fig. 1.*

Habitat in Monte Gargano Apuliae.

40. *Bubon garganicum.* Foliolis ovatis, pinnatifido-incisis, lobis obtusiusculis late vaginatis pubescentibus, seminibus hirtis, caule sulcato pubescenti herbaceo. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. p. XIX. Fl. Nap. vol. 1. p. 123. t. XXV.*

Habitat in Monte Gargano Apuliae.

41. *Bunium Petraeum.* Involucro pentaphyllo; foliis biternato-pinnatis carnosis, foliolis cuneiformibus subtripartitis, laciniis linearibus obtusis, caulibus numerosis filiformibus debilibus subnudis ramosis,

radice turbinata. Perenne. *Fl. Nap. Prod. sup. I. p. LX.*

Habitat in saxosis Magellae.

42. *Sison flexuosum.* Foliis uniformibus bipinnatis, foliolis cuneiformibus trifidis, laciniis linearibus acutis; caule flexuoso. Perenne. Habitus et fructus *aethusae*; sed involucris universalibus et partialibus diversum. *Fl. Nap. Prodr. sup. II. p. LXVI.*

Habitat in pratis editioribus Matesii.

43. *Sison Thomasii.* Foliis omnibus ternatis, foliolis cuneiformibus inciso-dentatis, dentibus aristatis; floribus paniculato-umbellatis, pedunculis capillaribus fasciculatis effusis; fructibus oblongis incurvis; involucro submonophyllo. Perenne. *Flor. Nep. Prodr. sup. II. p. LXVI.*

Habitat in nemoribus vulgo *della serra*, Calabriae Ulterioris, prope rivulos.

44. *Chaerophyllum hybridum.* Caule glabro striato scabriusculo, foliis tripinnatis, foliolis lanceolato-oblongis profunde inciso-serratis, laciniis acuminatis, superficie superiori glabra, inferiori rachide tantum hispida; fructibus biaristatis, aristis divaricatis. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. s. II. p. LXVI.*

Habitat in sylvis Magellae.

45. *Narcissus unicolor.* Spatha multiflora, petalis oblongis, nectario campanulato plicato lacero, petalis sextuplo breviore, scapo, foliis planis ligulatis, longiore. *Fl. Nap. Prodr. p. XXI. Fl. Nap. vol. 1. p. 144. tav. XXVI. Narc. latif. simplici flore prorsus albo. Clus. hist. 1. p. 155. Bar. ic. 937.*

Narcissus praecox totus albus major. C. B. pin. 49. num. 5. Barr. obs. 769. ic. 937. *N. cum pluribus floribus totus albus major.* J. Bau. Hist. 2. pag. 606.

Habitat in Insula Caprearum.

A *N. tazzetta* differt nectario petalis sextuplo breviore, habitusque totius plantae. A *N. niveo Loisl.* corollarum magnitudine, proportione nectarii ac tempore florescentiae; nempe nostra planta Novembris mense floret illa Aprilis.

46. *Narcissus praecox.* Spatha multiflora, petalis lanceolatis mucronatis, nectario subcampanulato plicato sexfido, petalis quadruplo breviore, scapo, folia plana ligulata, subaequante. *Fl. Nap. Pr. p. xx. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 146. *t. xxvii. Narc. latifolius, flore prorsus flavo. Clus. hist.* 1. *p.* 156. *Narcissus luteus costantinopolitanus* B. pin. 61. num. 3.

Habitat cum praecedente.

A *N. polyantho Loisl.* differt petalis oblongis longioribus, nectario sexpartito petalis quadruplo breviore, nec integerrimo petalis triplo breviore, floribus luteo-virescentibus non albis.

47. *Allium tenuiflorum.* Caule sub-teretifolio umbellifero, pedunculis capillaribus effusis, corollis cylindricis, petalis linearibus apice revolutis. Per. *Fl. Nap. Prodr. p. xxii. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 165. *t. xxx.*

Habitat in pratis siccis Montis Virginis, Cerealti, etc.

48. *Allium pendulinum.* Scapo nudo triquetro, foliis lanceolato-linearibus carinatis, umbella 3-

6-flora, spatha caduca, floribus longe pedunculatis pendulis, corollis globosis, petalis ovatis obtusis, capsulis turbinatis, sexlobatis, petalis persistentibus inclusis, bulbo solido simplici. *Pr. p.* XXII. *Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 168. *t.* XXXI.

A *triquetrum* habet bulbum oblongum, folia triquetra, petala ovata obtusa incurva, capsula rotundata, hinc a nostro longe diversum.

Habitat in valle vulgo *di S. Rocco.*

49. *Allium Majale.* Caule planifolio umbellifero, duplo foliis longiore, umbella fastigiata compacta, petalis ovalibus, staminibus simplicibus, duplo longioribus; foliis lato-lanceolatis canaliculatis. *Fl. Nap. Prodr. sup. I. p.* LX. *Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 160. *tav.* XXIX.

Habitat in arvis cultis prope Casertam.

Ab *A. carneo* differt umbella haemisphaerica compacta multiflora, petalis ovalibus integerrimis, foliis lato-lanceolatis longissimis.

50. *Tulipa praecox.* Caule unifloro glabro, flore erecto, petalis ovato-lanceolatis acuminatis apice barbatis, filamentis basi dilatatis, foliis ovato-lanceolatis, canaliculato-undulatis, margine ciliatis; bulbo lanato. Fl. Nap. vol. 1. p. 170. tav. 32.

Habitat Neapoli ad agrorum margines? In hortis colitur.

Tulipa gesneriana habet petala elliptica obtusa imberbia, folia glauca haud ciliata, bulbumque glabrum. *Tulipa oculus solis* Decand. Fl. Franc. tom. 3. pag. 200. *T. acutiflora* Encycl. tom. 7. est omnino glabra, ac petalorum basis, macula

lineari nigra margine aureo, picta conspicitur; stamina demum sunt pistillo longiora.

51. *Ornithogalum montanum.* Floribus corymboso-racemosis, pedunculis brevioribus, petalis linearibus, filamentis basi dilatatis, foliis oblongo-lanceolatis, canaliculatis subrepandis, bulbo solido simplici. *Fl. Nap. Prodr. p. XXII. Fl. Nap. vol.* I. *p.* 175. *t. XXXIII.*

Habitat in sylvis montis S. Nicolai prope Capuam.

52. *Ornithogalum exscapum.* Floribus corymbosis, petalis ovato-oblongis, filamentis basi dilatatis, pedunculis fructificantibus refractis, capsulis ovatis maximis sexangulatis, foliis linearibus canaliculatis flaccidis, bulbo solido simplici. *Flor. Nap. Prodr. p. XXII. Fl. Nap. vol. I. p.* 175. *tav. XXXIV.*

Ornithogalum vulgare aliud Clus. hist. 188. *Ornithogalo vulgari simile, latiore folio.* Bauh. hist. vol. 2. pag. 631.

Habitat in pratis editioribus prope Neapolim: *a i Camaldoli*, Casertae etc.

Ab *O. umbellato* differt foliis latioribus, concoloribus, non linea longitudinali alba exsaratis, petalis ovato oblongis non lanceolatis, capsulis ovatis angulato-repandis non oblongis, bulbo solido simplici, non prolifero.

Cl. Bauh. l. c. cum haec planta ab *O. vulgari* (*umbellato Lin.*) differi conatur, in ipsa folia *duplo latiora, linea albicante destituta esse* monet.

53. *Rumex hirsutus.* Floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis cordato-oblongis

obtusis, petiolis, costis, venis, caulisque internodiis hirsutis. Perennis. *Fl. Nap. Pr. p. XXIII.*

Habitat in Lucania.

54. *Polygonum elegans.* Caule suffruticoso, ramis flexuosis, foliis oblongo-lanceolatis, ochrea cylindrica, internodiis multoties breviore, multifido-ciliata floribus spicato-paniculatis, corollis regularibus. Perenne. *Fl. Nap. Pr. sup. II. p. LXVI. Fl. Nap. vol. 1. p. 207. t. XXXV.*

Habitat in collibus Martinae, Ginosae, etc.

A *P. divaricato* et *Bellardi* abunde differt, caule basi fruticoso, corollisque duplo majoribus; a *frutescenti* corollis regularibus, foliis minime nervosis, ochreisque multifido-ciliatis.

55. *Ruta divaricata.* Caule suffruticoso, foliis bipinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis remotis pellucido-punctatis, obtusis, obiter serratis; petiolis foliorumque ramificationibus divaricato-scandentibus, petalis ovatis crenatis. *Fl. Nap. Pr. p. XXIV. Fl. Nap. vol. 1. p. 222. t. XXXVI.*

Habitat in rupibus calcareis Salerni, et in Gargano.

A *R. graveolenti* differt, foliorum petiolis reflexo-divaricatis, petalisque crenatis, nec undulato crispis; a *R. chalepensi* bracteis linearibus nec cordatis, petalis minime ciliatis.

56. *Cucubalus angustifolius.* Foliis lanceolato-linearibus acutis subcarnosis glabris integerrimis, calycibus campanulatis reticulato-venosis, petalis bifidis, capsulis trilocularibus. Perennis. *Prodr. p. XXV. Fl. Nap. vol. 1. p. 233. t. XXXVIII.*

Habitat in locis aridis et sterilibus obvius.

A C. behen differt floribus laxe paniculatis, non confertis, foliis lanceolato-linearibus, non ovato-lanceolatis; caule prostrato ramosissimo. A *Silene maritima* Smith. Fl. Brit. vol. 2. pag. 468. differt floribus paniculatis, non caulibus subtrifloris, radice minime repente, capsulis ovatis non subrotundis.

57. *Silene canescens.* Caulibus prostratis incurvis, villosis, foliis obovatis longe petiolatis, hirsuto-canescentibus, floribus spicato-racemosis. petalis bifidis, capsulis ovatis pedicellatis. Peren. *Fl. Nap. Prodr. p. xxv. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 236. *t. xxxix.*

Habitat in arena littoris prope Neapolim, et Puteolos.

Proxima *S. sericeae All.* sed hec floribus terminalibus, ramis subtrifloris, foliis lanceolatis, capsulis subrotundis, carpophoris duplo longioribus gaudet; a *Sil. bipartita* tamen differt floribus lateralibus; non paniculato-dichotomis, caule prostrato non erecto, foliisque crassioribus brevioribus.

58. *Arenaria Rosani.* Foliis lineari-lanceolatis mucronatis hirsutis striatis, caule erecto hirsuto subtrifloro, petalis obovatis, calycibus striatis duplo-longioribus. Planta sesquipollicaris. Perennis. *Pr: p. xxvi.*

Habitat in Lucania.

59. *Sedum Nolarjanni.* Caule adscendente herbaceo, foliis planis petiolatis alternis ovatis, sinuato-dentatis, dentibus obtusis, floribus intrafoliaceis

sparsis, petalis acutis albis apice viridibus. Bien. *Fl. Nap. Prodr. p. XXV. Fl. Nap. vol. 1. p. 245. t. XL.*

Habitat in rupibus calcareis prope Fundos.

A *S. populifolio* differt floribus solitariis axillaribus, non paniculato-corymbosis.

60. *Sedum deltoideum.* Caule erectiusculo, foliis planis alternis, deltoideo-cuneiformibus inaequaliter crenatis, dentatisque, cymis lateralibus, petalis purpureis. Ann.

Habitat in Monte novo, prope Puteolos; in Insula Caprearum.

61. *Sedum Magellense.* Caule adscendente, foliis obovato-oblongis, sessilibus, foliis racemosis sparsis, breviter pedunculatis, petalis acutis luteis. Annuum. *Prodr. p. XXVI.*

Habitat in nemoribus Magellae; prope Caramanicum.

62. *Sedum rostratum.* Foliis linearibus teretibus depressis sessilibus, basi solutis glaucis, caulis basi spiraliter sexfariam confertis, demum sparsis, cyma bifida pauciflora, petalis linearibus luteis, capsulis rostratis, calycibus acutis sesquilongioribus. Perenne. *Prodr. p. XXVI.*

Habitat in rupibus calcareis prope Casertam, et in Lucania.

63. *Sedum rufescens.* Foliis ovalibus tereti-depressis sessilibus basi solutis incurvis glauco-rufescentibus aristatis, caulis basi spiraliter 5-fariam confertis, demum sparsis; cyma 4-fida 2-fida, petalis linea-

ribus pallide luteis patentibus, capsulis rostratis calycibus obtusis duplo longioribus. Per. *Fl. Nap.* p. XXVII. *Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 248. *t.* XLI.

Sedum minus IV. Clus. hist. 2. *pag.* 60. An *S. rupestre, var. florib. pallidis; Encyclop.* ?

Habitat in muris et tectis obvius.

Affinis *S. reflexo* et *rupestri*; a quibus differt foliis ovalibus tereti-depressis obtusiusculis non cylindraceis exquisite subulatis; caule erecto, petalis pallide luteis; cultura non immutatur.

64. *Cerastium pilosum.* Diffusum, pilosum; fol. ellipticis obtusis, calycibusque, corollis longioribus, ciliato-piliosis; pilis patentibus mollissimis, floribus paniculatis, capsulis oblongis. Ann. *Prod.* p. XXVII.

Habitat in montibus Samnii, et in Magella.

65. *Cerastium praecox.* Diffusum villoso-viscosum; foliis inferioribus spathulatis, superioribus ovato-oblongis, utrinque villosis, panicula ramosissima dichotoma, corollis calycibus duplo-longioribus, pedunculis capillaribus, capsulis oblongis. Annua. *Pr. loc. cit.*

Alsine hirsuta magno flore. Bauh. p. 250. ?

Habitat in arvis aridis prope Neapolim.

66. *Cerastium Scarani.* Diffusum, ramis flexuosis lanatis, pilis retroflexis, foliis lanceolato-oblongis acutis, utrinque tomentoso-viridibus, corollis calyce-duplo longioribus, capsulis ovatis, pedunculis fructificantibus horizontalibus. Perenne. *Pr. loc. cit.*

Habitat in montibus Samnii.

67. *Cerastium columnae.* Diffusum; foliis lineari-

bus tomentosis incanis, panicula dichotoma, corollis calyce duplo longioribus, capsulis fructificantibus oblongis. Perenne. *Pr. l. c. Col. phytob. app. p.* 115. *tav.* 36. *C. tomentosum Encyclop.*

Habitat in nostris montibus commune.

A *C. tomentoso* differt foliis linearibus, capsulisque oblongis.

68. *Cerastium longifolium.* Diffusum; ramis divaricatis, foliis lanceolato-linearibus, tomentosis sublanato-virescentibus, panicula dichotoma, corollis calyce duplo-longioribus, capsulis fructificantibus oblongis. Perenne. *Pr. l. c.*

Habitat in montibus Samnii.

69. *Cerastium hirsutum.* Diffusum; hirsuto-viscosum, caulibus repentibus, foliis oblongis obtusis, basi attenuatis hirsutis canescentibus, floribus paniculatis, corollis calyce duplo-longioribus, capsulis oblongis, subincurvis. Peren. *Pr. l. c.*

Habitat in Montibus Samnii.

70. *Lythrum Graefferi.* Foliis alternis lineari-lanceolatis, floribus solitariis axillaribus hexapetalis dodecandris. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. sup. II. p. LXVII.*

Habitat in montibus prope Casertam.

71. *Euphorbia Neapolitana.* Umbella 5-fidadichotoma, involucellis cordato-reniformibus mucronatis integerrimis, passim basi incisis, foliis lanceolato-oblongis, glabris retusis, petalis rostratis lunatis. *Fl. Nap. Pr. p. XXVIII. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 266. *t. XLII.*

Habitat ad agrorum margines prope Neapolim.

E. provinciali, et *E. italicae Lmk.* affinis; ab illa differt foliis elliptico-oblongis, umbella quinquefida dichotoma, involucellis haud mucronatis, ramis fertilibus; *ab italica* foliis minime profunde dentatis, umbella 5-fida dichotoma, involucellis cordato-reniformibus denticulatis, non cordato-ovatis serratis.

72. *Euphorbia ceratocarpa.* Umbella 5-fida, 4-fida dichotoma, involucellis ovatis obtusis mucronatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis glaucis, capsulis glabris, verrucis coadunatis ramosis incurvis. Suffrutex.

Var. Caule humiliore, fol. acutiusculis, umbella diffusa ramosissima. *Fl. Nap. p. l. c. Fl. vol.* 1. *p.* 268. *t. XLIII*

Habitat in maritimis Calabriae Ulterioris, et Apuliae.

Proxima *E. orientali*, sed caulis in hac herbaceus, in illa suffruticosus, capsulae glabre verrucis coadunatis ramosis, obsitae, non pilosae laeves, differentiam constituunt. Icon *E. orientalis* Buxbaumii cent. 2. pag. 29. tab. 26., nostrae plantae minime quadrat.

73. *Euphorbia caespitosa.* Umbella 5-8-fida-dichotoma, ramosissima, involucellis, cordato-semiorbiculatis integerrimis, foliis confertis lanceolato-linearibus obtusiusculis mucronatis, ramis floriferis, petalis lunatis, capsulis margine scabris, seminibus reticulato-griseis. Perenn. *Tithymalus linifolius, major italicus. Barr. rar.* 60. *ic.* 821.

An. Euphorbia pinea Lin.? Prodr. p. XXIX. sub nomine E. linifoliae.

Habitat in rupibus calcareis Insulae Caprearum.

74. *EUPHORBIA BASELICIS.* Umbella multifida bifida, involucellis cordato-semiorbiculatis, foliis inferioribus obovatis, superioribus parabolicis, rotundatis, amplexicaulibus, petalis bicornibus, capsulis glabris. Suffrutex. *Prodr. l. c.*

Habitat in Gargano.

75. *PRUNUS COCOMILIA.* Pedunculis geminis, foliis ovalibus utrinque glabris crenulatis, petiolis, crenisque glandulosis. *Pr. sup. II. p. LXVII.*

Habitat in saepibus Calabriae Ulterioris.

76. *POTENTILLA APENNINA.* Foliis ternatis, utrinque tomentoso-argenteis, foliolis ovalibus, apice bifidis, caule fruticoso-caespitoso, cauliculis floriferis filiformibus subtrifloris, receptaculis lanatis. *Prod. p. XXX. Fl. vol. 1. p. 291. t. XLVI. Heptaphyllum argenteum alpinum trifoliatum longius radicatum, saxatile sabaudum*, Bocc. mus. p. 20. tab. 9. f. 4.

Habitat in alpinis Aprutii, *al Monte Amaro; al Majellone*, et in *Monte Cairo* prope *S. Germano.*

P. nitidae proxima, a qua tamen differt foliis ovalibus integris vel apice-bifidis, non cuneiformibus trifidis; caulibus multifloris, calycibus argenteo-sericeis, non subglabris purpureis. *Cl. Bocconius*, felicissimus plantarum scrutator, primus hanc plantam, a *P. nitida* distinxit.

77. *POTENTILLA DETHOMASII.* Foliis quinatis, radi-

calibus rariter septenatis, foliolis obovatis, grosse dentatis, utrinque sericeo-villosis, supra virescentibus subtus incanis, caule suberecto corymbifero, receptaculis hirsutis, petalis subrotundis emarginatis luteis. Perennis. *Pr. sup. I. p. LXI. Fl. Nap. vol. I. p. 285. t. XLIV.*

Habitat in Pollino.

Media inter P. rectam et argenteam. A *P. argentea* differt foliis dentatis, non incisis; corymbis compactis, petalis emarginatis, magnitudine florum, nec non sericea hirsutie totius plantae.

78. *Potentilla calabra.* Foliis quinatis cuneiformibus multifidis, utrinque tomentosis subtus candidissimis, caule prostrato, petalis calyce majoribus, receptaculo villoso. *Prod. sup. II. p. LXVII. Fl. Nap. vol. I. p. 287. tav. XLV.*

Habitat in saxosis montium Calabriae; *al Pollino, alla Sila, a Monte Cucuzzo, ec.*

P. argentea habet folia subtus tantum tomentosa, minus incisa, et caulem erectum.

79. *Helianthemum Barrelieri.* Suffruticosum, stipulatum, caulibus rigidis erectis, foliis confertis, lanceolato-linearibus revolutis obtusis villosis, pedunculis villosis, petalis calyce majoribus. *Prodr. p. XXXI. Chamaecistus luteus, thymifolius, polianthus.* Barr. rar. 517. ic. 449.

Habitat in Insula Caprearum, et in Lucania.

Ab *H. glutinoso* differt foliis brevioribus et latioribus, calycibus obtusis corollis duplo brevioribus; planta nullomodo glutinosa.

80. *Helianthemum viride.* Suffruticosum, stipula-

tum, caulibus flaccidis procumbentibus, foliis linearibus acutis revolutis, glabris laetevirentibus, pedunculis villosis. *Prod. l. c. Fl. vol. I. t. XLVII.*

Habitat in Insula Caprearum.

81. *Helianthemum hyssopifolium.* Suffruticosum stipulatum, foliis inferioribus ovalibus, superioribus lanceolato-linearibus, utrinque viridibus planis hirsutis, calycibus hirsutis, capsulis duplo longioribus. Planta hirta. *Pr. l. c.*

Habitat in collibus Lucaniae.

Affine *H. obscuro*, a quo differt foliis superioribus lanceolato-linearibus nec ellipticis, ac longitudine calycis; species intermedia inter H. obscurum et grandiflorum.

82. *Clematis fragrans.* Foliis compositis, decompositisque, foliolis ternatis, lobatisque ovatis, obtusis, integerrimis, petalis lanceolatis emarginatis patentibus, seminibus caudatis. *Prodr. p. XXXII. Fl. vol I. t. XLVIII.*

Habitat in saepibus prope Bajam.

C. flammula habet foliola angusto-lanceolata laciniata, flores parvos, hinc a nostra diversa.

83. *Ranunculus brutius.* Calycibus patulis, foliis ternato-quinquepartitis, foliolis tripartitis, laciniis lanceolatis bifidis utrinque pubescentibus, petalis luteis calyce duplo longioribus, pedunculis teretibus, caulibusque villosis, radice fibrosa. Perennis. *Pr. sup. I. p. LXI. Fl. vol. I. t. L.*

Habitat in monte Pollino.

Affinis *R. acri*, a quo differt foliorum laciniis latioribus undique serratis, glabriusculis, nec vil-

losis apice tantum vix dentatis, corollis duplo majoribus aureo-lutescentibus; a *R. polyanthemo* foliis digitato-partitis glabriusculis, pedunculis teretibus nec striatis, diversus.

84. *Ranunculus brevifolius.* Foliis radicalibus reniformibus coriaceis apice trilobis, lobis lateralibus subcrenatis, intermedio usque ad folii tertiam partem producto, petiolis flexuosis, caulino sessili cuneiformi tripartito, caule incurvo unifloro. *Pr. sup. II. p. LXVIII.*

Habitat in saxosis Magellae.

Affinis *R. Thorae* a quo differt foliis non apice emarginatis ac toto ambitu crenatis, sed profunde trilobatis lineas sex lata, et tres longa, caule folio unico minimo instructo, non inferiori maximo reniformi, ut in *thora*, ac toto habitu.

85. *Ranunculus magellensis.* Foliis radicalibus cordato-reniformibus apice trilobis, lobis crenatis, caulino lanceolato, integerrimo, caule subunifloro. Petala alba.

Habitat in alpinis Magellae.

Affinis R. alpestri, a quo differt foliis trilobatis, lobis crenatis, nec tripartitis, laciniis trilobatis. *Pr. l. c.*

86. *Ranunculus Thomasii.* Foliis radicalibus ternatis, foliolis tripartito-trifidis, supra glabris, subtus villosis, caulinis mediis tripartitis; summis integerrimis linearibus, laciniis linearibus, caule simplici, vel bifido, calycibus patentibus pedunculis teretibus. Planta villoso-sericea. *Pr. l. c.* Species intermedia inter. R. *flabellatum et millefoliatum.*

Habitat in vallibus Silae Calabr. Ceterioris, in loco vulgo dicto: *vallone del Crocefisso*.

87. *Satureja tenuifolia*. Pedunculis axillaribus solitariis, 3-6-floris, bracteis calyce brevioribus, foliis inferioribus ovato-lanceolatis, superioribus lanceolato-linearibus, acuminatis revolutis, hispidis, caule suffruticoso ramoso, ramis filiformibus. *Pr. pag. XXXIII.*

Habitat in collibus Apuliae.

88. *Sidertis brutia*. Suffruticosa, tomentoso-lanata, foliis oblongis crenulatis dense lanatis, floribus verticillato-spicatis; bracteis ampliatis cordatis mucronatis glabriusculis, laete-viridibus, corollis luteis. *Pr. l. c.*

Habitat in monte Pollino Calabriae Citerioris.

89. *Mentha Pyramidalis*. Floribus capitatis, foliis ellipticis acuminatis, inaequaliter serratis hirsutis petiolatis, staminibus corolla brevioribus. Peren. *Pr. l. c.*

Habitat in fossis prope Neapolim, et in rivulis Principatus Ulterioris.

90. *Mentha macrostachya*. Spicis elongatis, foliis ovato-ellipticis, argute inaequaliter serratis, hirsutis sessilibus. Perennis. *Pr. p. XXXIII.*

Habitat in locis humidis communis.

91. *Lamium Longiflorum*. Foliis cordatis bidentatis laeviusculis, breviter petiolatis, caulibusque hirsutis, verticillis sub-10-floris, corollae tubo calyce duplo longiore, dente unico setaceo. Perenne. *Pr. p. XXXIV.*

Habitat in Magella, prope rivulos.

62. *Lamium flexuosum*. Foliis cordato-ovatis grosse dentatis, passim bidentatis, maculis sparsis, caulibus debilibus basi flexuosis, verticillis sub-10-floris, corollae tubo calycis longitudine. Perenne. *Pr. l. c.*

Habitat in sylvis, et saepibus umbrosis.

93. *Stachys polystachia*. Viridi-tomentosa, verticillis multifloris, foliis radicalibus ovalibus, basi cordatis, caulinisque cordato-ovatis, inaequaliter crenatis, floralibus lanceolatis serratis, verticillis subspicatis, caule ramoso. *Pr. l. c.*

Habitat in sylvis prope Neapolim et alibi.

94. *Stachys salviaefolia*. Albo-tomentosa, verticillis multifloris, foliis oblongo-ellipticis, obtusis crenatis, verticillis subspicatis, caulibus simplicibus. *Pr. l. c.*

Habitat in arvis incultis Principatus Ulterioris, Aprutii et Lucaniae.

95. *Stachys pubescens*. Verticillis sex-floris subspicatis, foliis ovato-lanceolatis, acutis, basi attenuatis, dentatis quinque nerviis pubescentibus, caule decumbente, calycibus lanatis inermibus. *Pr. l. c.*

Habitat in Lucania.

96. *Marrubium apulum*. Foliis cordato-subrotundis inaequaliter duplicato crenatis, plicato-undulatis supra viridibus, flocoso-tomentosis, albo marginatis, subtus dense tomentosis, calycibus 10-dentatis, dentibus villosis patentibus uncinatis. *Pr. l. c.*

Habitat in Apulia.

97. *Phlomis ferruginea*. Foliis oblongis basi-

cordatis, crenatis supra viridibus, albo marginatis, subtus ferrugineo-tomentosis, involucris lanceolatis, caule fruticoso lauato. *Pr. p. xxxv.*

Habitat in Lucania.

98. *Thymus Marinosci.* Capitulis arcte imbricatis, bracteis ovato-oblongis, foliisque linearibus planis, undique punctatis, laevibus ciliatis, caule fruticoso. *An. T. striatus. Vahl.? Pr. l. c.*

Habitat cum praecedente.

99. *Thymus virgatus.* Pedunculis axillaribus, subtrifloris, cymosis bracteatis, foliis linearibus obtusis scabris, margine revolutis, caulibus erectis suffruticosis rigidis virgatis. *Pr. l. c.*

Habitat in aridis prope Martinam.

100. *Thymus acinoides.* Floribus dense verticillatis subsessilibus, verticillis 6-floris, caulibus adscendentibus suffruticosis simplicibus, foliis inferioribus ovatis ellipticis, obtusis petiolatis, superioribus lanceolatis subintegerrimis, acutis impunctatis, utrinque viridibus; corollis calycibus duplo longioribus. *Pr. l. c.*

Habitat in collibus aridis Lucaniae.

101. *Euphrasia pectinata.* Foliis inferioribus ovatis, superioribus subrotundo-ovatis, pectinato-dentatis, dentibus setaceis, laciniis labii corollae inferioris emarginatis. Annua. *Pr. p. xxxvi.*

Habitat in pratis Magellae.

Ab *E. salisburgensi* differt, foliis ovatis, bracteisque late-cordatis.

102. *Antirrhinum pallidum.* Caule repente, foliis reniformibus obiter quinquelobis, oppositis pubo-

scentibus glaucis, floribus longe pedunculatis concoloribus. Annuum. *Pr. l. c. sub nomine A. pubescentis.*

Habitat in fissuris rupium prope rivulos Magellae, in loco vulgo dicto: *Valle Buglione.*

103. *Antirrhinum acutangulum.* Foliis alternis cordato-reniformibus 5-lobis glabris, lobis acutis mucronatis. Planta tenerrima, gracilis. *Pr. sup. II. p. LXIX.*

Habitat in fissuris rupium Pedemontii Aliphani.

104. *Scrophularia grandidentata.* Foliis cordato-oblongis laevibus profunde bidentatis, dentibus divergentibus, subtus pubescentibus, panicula racemosa terminali, pedunculis trichotomis; caule, petiolisque villosis. *Pr. sup. II p LXVIII.*

Habitat in nemoribus Matesii, Magellae.

A *Betonicaefolia*, cui affinis, differt foliis bidentatis nec dentibus integerrimis, foliis latioribus laevibus; a *S. scorodonia* et *biserrata*, foliis revera profunde bidentatis, dentibus divergentibus, nec argute serratis, racemo aphyllo etc.

105. *Iberis stylosa.* Herbacea; foliis subcarnosis, inferioribus ovalibus, basi spathulatis, petiolatis subintegerrimis, caulinis amplexicaulibus oblongis obtusis; siliculis obcordatis, stylis duplo brevioribus. Planta pollicaris biennis. *An. Thlapsi minimum. Ard. spec. 2. p. 37. t. 15. fig. 1.? Prod. p. XXXVII.*

Habitat in editoribus montis *Amari* in Aprutio.

106. *Alyssum rupestre.* Caulibus erectis suffruticosis subnudis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque ar-

genteo-canis, racemis simplicibus, siliculis obovatis. Floribus albis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in fissuris rupium Magellae.

107. *Alyssum diffusum* Caulibus herbaceis diffusis, foliis incanis lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis, racemo simplici. *Pr. l. c.*

Habitat in alpinis Aprutii.

108. *Alyssum cuneifolium.* Caulibus herbaceis diffusis, foliis incanis obovato-cuneatis subcarnosis, racemo simplici. *Pr. l. c.*

Habitat cum praecedente.

109. *Biscutella marginata.* Siliculis undique scabris, margine fuscis, caule subnudo, foliis lyratis lobis obtusis, impari maximo subrotundo, bidentatis pilosis. *Pr. p. xxxviii.*

Habitat in maritimis Insulae Caprearum.

110. *Biscutella maritima.* Siliculis laevibus, margine ciliatis concoloribus; caule subnudo, foliis lyratis, lobis obtusis, impari maximo elliptico, grosse bidentatis, pilosis. *Pr. l. c.*

Habitat ibid.

111. *Biscutella Columnae.* Siliculis undique scabris, foliis obovatis in petiolum attenuatis, dentatis hispidis, caule subaphyllo hispido, ramis approximatis. *Pr. l. c. Jondraba alyssoides apula spicata.* Col. ecph.. 1. p. 283. 1. 284. fig. 1. Bar. ic. 253. t. 1.

Habitat in Apulia et Lucania.

Var. foliis sinuato-lyratis.

In Col. et Bar. l. c. t. 1. 2. duo icones extant ab auctoribus sub Biscutella apula indistincte

refertae, quarum alterae ad veram. *B. apulam* pertinent; primae vero ad nostram: ab illa satis distinguenda, foliis, ramificatione, ac toto habitu.

112. *Hesperis heterophylla.* Caule ramoso diffuso hispido; foliis inferioribus ellipticis subintegerrimis, superioribus ovato-lanceolatis, ovalibusque, dentato-angulosis, pubescentibus, petalis integerrimis, siliquis arcuatis torulosis pedunculatis. *Pr. l. c.*

Habitat in agris umbrosis Aprutii, Principatus Ulterioris etc.

113. *Arabis collina.* Caule adscendente simplici, foliis obovatis obtuse dentatis utrinque scabris, caulinis oblongis obtusis, siliquis compressis strictis. *Pr. p. xxxix.*

Habitat in collibus aridis prope Neapolim.

114. *Brassica incana.* Siliquis glabris cuspidatis subteretibus, foliis radicalibus lyratis tomentoso-incanis, sinuato-dentatis, caulinis sinuato-erosis auriculatis, supra glabriusculis. *Pr. l. c.*

Habitat in rupibus Insulae Caprearum, et prope Neapolim in locis vulgo dictis: *Camaldoli, Capo di Coruoglio, ai Bagnoli* etc.

115. *Brassica Gravinae.* Foliis oblongis lyrato-runcinatis, lobis lateralibus integerrimis extimo dentato, hispidis, petiolis trinervatis, caule hispido, calyce patulo, floribus luteis. Perenn. *Ib.*

Habitat in montibus Aprutii Ulterioris prope Sulmonam, et in Monte Matesio.

116. *Brassica hispida.* Foliis lyrato-runcinatis dentatis, hispidis, caule hispido herbaceo, siliquis

stylo obtusiusculo, calyce conniventi, petalis erectis albis fusco-venosis. Annua. *Pr. l. c.*

Habitat in arvis Lucaniae.

117. *Sinapis apula.* Siliquis laevibus patentibus, stylo oblongo compresso, foliis runcinato-pinnatifidis glabris, laciniis omnibus lanceolatis dentatis acutis. *Ib. l. c.*

Habitat in arvis Apuliae.

118. *Erodium Gussonii.* Pedunculis multifloris longissimis, foliis cordatis lobatis obtusis dentatis glaucis, caule, petiolisque hirtis, corollis calycibus aristatis duplo longioribus. Perennis. *Prodr. p. xxxix.*

Habitat in pratis apricis Principatus Ulterioris, et prope Martinam.

119. *Geranium villosum.* Pedunculis bifloris orbiculato-cordatis novemlobis, lobis trifidis obtusis, corollis calyce duplo longioribus, petalis emarginatis; caule erecto. Planta villosa, pilis mollissimis horizontalibus obsita. Ann. *Pr. sup. 1. p. lxii.*

Habitat in paludibus Silae.

120. *Geranium nemorosum.* Pedunculis bifloris, foliis reniformibus, palmato-septem partitis, lobis cuneiformibus trifidis, laciniis tridentatis, caule erecto ramoso, petalis reticulato-venosis integerrimis. Planta pubescens, perennis. *Pr. l. c.*

Affinis *G. pyrenaico* a quo differt foliis profunde sectis, petalisque integerrimis.

Habitat in nemoribus Principatus Ulterioris, Calabriae Citerioris et Samnii.

121. *Malva hirsuta.* Caule hirsuto decumbente, fo-

liis inferioribus subrotundo - cordatis, 7 - lobatis, superioribus palmato-5-partitis, crenatis hirsutis, pedunculis axillaribus, folio duplo longioribus. *Prod. l. c.*

Habitat in Apulia et Lucania.

122. *Malva vulgaris.* Caule diffuso prostrato herbaceo, foliis septemlobatis, lobis rotundatis obtusis, crenato-dentatis, calyce exteriore triphyllo, foliolis lanceolatis, corollis calycibus quadruplo longioribus. Planta subhispida. Biennis. *Prod. sup. I. p. LXII.*

Habitat in ruderatis communis.

123. *Malva Alceoides.* Caule erecto, foliis radicalibus orbiculato-cordatis septemlobatis, inferioribus septempartitis, laciniis cuneiformibus incisis, apice dilatatis; superioribus palmato-quinque partitis, laciniis pinnatifidis; calycis exterioribus foliolis lanceolatis, interioribus laciniis ovato-lanceolatis acutis. Planta hispido-scabra, pilis fasciculatis expansis. Peren. *Pr. l. c.*

Habitat in sylvis prope Neapolim, in loco vulgo dicto: *Camaldoli.*

124. *Lavatera silvestris.* Caule herbaceo, hispido-scabro, foliis inferioribus quinquelobo-angulatis, superioribus trilobis, lobo medio duplo longiore, lobis lanceolatis acutis dentatis, pedunculis solitariis folio brevioribus, capsulis denudatis. *Prod. p. XL.*

Habitat ad sylvarum margines Principatus Ulterioris, et Aprutii.

125. *Lavatera Neapolitana.* Caule herbaceo erecto,

ramis patentibus, foliis septemlobatis obtusis, pedunculis axillaribus aggregatis, calyce interiore, exteriore duplo longiore, laciniis acuminatis. Planta hispido-scabra, pilis fasciculatis. Perennis. *Pr l. c.*

Habitat in maritimis Pausylippi et alibi.

126. *Genista anxantica.* Foliis ovato-ellipticis subcoriaceis glaberrimis venosis, ramis angulatis diffusis, leguminibus glabris, racemis terminalibus. Perennis. *Fl. Nap. Pr. p.* XLI.

Habitat in collibus aridis, vallis Anxanti, Principatus Ulterioris.

127. *Ononis diffusa.* Floribus subsessilibus lateralibus; foliis ternatis cuneatis glabris, stipulisque lanceolatis argute-denticulatis, calycibus scariosis, corollis purpureis, brevioribus. Annua. *Ib. l. c.*

Habitat in aridis incultis *Bagnoli.*

128. *Ononis oligophylla.* Caule adscendente villoso, foliis simplicibus orbiculatis, stipulisque ovatis glabris creuulatis; floribus racemosis, subpedunculatis, solitariis, calycibus villosis corolla brevioribus. Annua. *Pr. p.* LXIX.

Habitat in pratis Principatus Ulterioris, et Lucaniae.

Affinis *O. albae*, a qua differt fig. folior., magnitudine corollarum, caule adscendente etc.

129. *Ervum longifolium.* Pedunculis multifloris, leguminibus glabris hexaspermis, folio cirrhoso, foliolis linearibus acuminatis. Annuum. *Ib. l. c.* *Vicia gracilis.* Lois.

Habitat in Lucania.

130. *Ervum lentoides.* Pedunculis subbifloris, leguminibus glabris dispermis; foliolis inferioribus ellipticis, superioribus oblongis obtusis, stipulis semi-sagittatis basi dentatis. Planta pubescens. Annua. *Pr. sup. II. p. LXVIII.*

Habitat in arvis Lucaniae.

Affinis *E. olenti*, a quo differt stipulis dentatis, magnitudine etc.

131. *Ervum Uniflorum.* Pedunculis unifloris, leguminibus glabris dispermis, folio non cirrhoso, foliolis oblongis obtusis, infimis obcordatis. Annuum. *Ib. l. c.*

Habitat ibid.

132. *Vicia ochroleuca.* Pedunculis multifloris folio longioribus, floribus imbricatis, foliolis ovato-lanceolatis, obtusis mucronatis glabris, stipulis semisagittatis lineari-subulatis integerrimis. Perennis. *Ib. p. XLII.*

Habitat in saepibus Insulae Caprearum et prope Stabias.

133. *Hyppocrepis glauca.* Leguminibus pedunculatis confertis, rectis vel subarcuatis, scabris, margine interiore 5-sinuato, foliolis oblongo-linearibus glaucis, calycibus pubescentibus. Perennis. *Ib. p. XLIII.*

Habitat in fissuris rupium Magellae.

Ab *H. comosa* differt leguminibus duplo longioribus unico latere excavatis, foliisque glaucis.

134. *Orobus variegatus.* Foliis bi-trijugisve, foliolis late-ovatis acuminatis stipulis ovato-semi-sagittatis integerrimis, caule simplici, laciniis calycinis set-

ceis, racemis subvigintifloris. Perennis. *Pr. sup.* I. *p.* LXII. *Colum. phytobas. pag.* 59. *tav.* 14.

Habitat in sylvis prope Neapolim communis.

Ab *O. verno* differt, dentibus calycinis lanceolatis, racemo compacto multifloro, corollis vexillo reticulato-venoso.

135. *Melilotus Neapolitana.* Leguminibus monospermis obovatis obtusis, nudis arcuatim rugosis, racemis folio longioribus, caule erecto, foliolis deltoideo-obovatis, apice dentatis, stipulis setaceis integerrimis, floribus patentibus. Annua. *Prodr. sup.* I. *p.* LXVI.

Habitat in collibus apricis, prope Neapolim.

136. *Melilotus longifolia.* Leguminibus monospermis subrotundis obtusis arcuatim rugosis, racemis folio longioribus, caule erecto angulato, foliolis oblongo-linearibus serrulatis obtusis. Annua. *Ibid. loc. cit.*

Habitat in arvis Lucaniae.

A *M. lineari* differt foliolis linearibus integerrimis, et caule vix ramoso.

137. *Melilotus rotundifolia.* Leguminibus monospermis subrotundis obtusis arcuatim rugosis, racemis folio longioribus, caule erecto angulato, foliolis obovato-subrotundis, retusis denticulatis, stipulis dentatis. Annua. *Ib. l. c.*

Habitat in collibus prope Neapolim, et in Lucania.

A *M. italica* differt leguminibus monospermis, foliisque dentatis emarginatis.

138. *Trifolium rupestre.* Spica terminali globosa villosa pedunculata, calycinis dentibus setaceis patulis corollam aequantibus, caulibus subsimplicibus basi suffruticosis, foliolis rhombeo-obovatis glabris serrulato-spinulosis venosis. Perenne. *Ib. p. XLIII.*

Habitat in rupibus Magellae.

139. *Trifolium tenuiflorum.* Spicis cylindricis villosis, cinctis foliis oppositis sessilibus, dentibus calycinis subulatis mucronatis rigidis longitudine corollae, foliolis obovato-cuneatis serrulatis villosis. Annuum. *Pr. pag. XLIV.*

Habitat in sylvis prope Neapolim.

140. *Trifolium tenuifolium.* Capitulis globosis terminalibus subgeminatis, cinctis foliolis oppositis sessilibus, calycibus villosis, dentibus setaceis inaequalibus, corolla brevioribus, foliolis inferioribus obcordato-cuneatis, superioribus liuearibus obtusis, denticulatis pilosis, caule simplici erecto villoso. Annuum. *Ib.*

Habitat ibid.

141. *Lotus ciliátus.* Leguminibus solitariis cylindraceis glabris sessilibus, caulibus prostratis, foliis glabris margine, calycibusque ciliatis. Annuum. *Ibid.*

Habitat in pratis humidis Silae.

142. *Medicago cancellata.* Pedunculis subbifloris folio brevioribus, leguminibus cochleatis cylindricis utrinque planis, anfractibus quinis distantibus, aculeis setaceis arcuatis distichis adpressis subpilosis, stipulis subdentatis integerrimisve,

foliolis obovatis denticulatis. Planta pubescens. Annua. *Ib.*

Habitat in agris.

143. *Medicago histrix.* Pedunculis subbifloris folio longioribus, leguminibus cochleatis cylindricis utrinque compressis, anfractibus quinis subdistantibus, aculeis distichis subulatis divergentibus rectis uncinatis subpilosis; stipulis pectinato-multifidis, foliolis obovatis retusis denticulatis. Planta glabra. Annua. *Pr. p. XLV.*

Habitat ibid.

A *M. ciliari* differt leguminibus glabris, pedunculisque multifloris.

144. *Medicago flexuosa.* Pedunculis multifloris, leguminibus cochleato-flexuosis glabris, anfractibus binis reticulatis, margine aculeatis, aculeis distichis arcuatis brevibus, stipulis ciliato-dentatis; foliolis obovatis retusis dentatis. Planta glabra. Annua. *Ibid.*

Habitat ibid.

145. *Medicago arenaria.* Pedunculis subbifloris folio brevioribus, leguminibus cochleatis subcylindricis utrinque planis, anfractibus quaternis approximatis, aculeis raris distichis arcuatis divergentibus uncinatis glabris, stipulis subdentatis, integerrimisve, foliolis obovatis denticulatis. Planta pubescens. Ann. *Pr. p. XLV.* sub nomine *M. littoralis.*

Habitat in arenosis Puteolorum.

146. *Medicago agrestis.* Pedunculis subbifloris leguminibus cochleatis muricatis utrinque planis, an-

fractibus quinis, aculcis leguminum latitudine aequantibus, subulatis rectis uncinatis; stipulis setaceo-dentatis; foliolis cuneiformibus apice dentatis. Planta pubescens. Annua.

Habitat in agris prope Casertam.

Affinis *M. Gerardi*, a qua differt caulibus pedem et ultra decurrentibus etc. *Pr. sup. II. l. c.*

147. *Apargia cichoracea.* Scapo squamoso unifloro glabro, foliis obovatis, basi dentato-runcinatis glabriusculis, petiolis hirtis, pilis furcatis, calycinis squamis acutis hirtis, radice tuberosa fasciculata. Perennis. *Pr. p. XLVI.*

Habitat in pratis montuosis Stabiaram, et Lucaniae.

148. *Apargia lyrata.* Scapo nudo unifloro, calyceque hispido, foliis lyrato-pinnatifidis, laciniis rotundatis, alterne dentatis hispidis, pilis trifurcatis, radice fusiformi. Perennis. *Ib. l. c.*

Habitat in pratis prope Neapolim.

149. *Apargia saxatilis.* Scapo subramoso, subfolioso, calyceque hispido, foliis pinnatifido-dentatis hispidis, pilis furcatis. Perennis. *Prodr. loc. cit.* *Hieracium alterum saxatile montanum. Colum. ecphr. I. p. 244. t. 243.*

Habitat in montibus calcareis communis.

150. *Hypochaeris pinnatifida.* Caule ramoso basi hispido, foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis, laciniis lanceolatis repandis subintegris, caulinis linearibus, basi multifidis integerrimisve hispidis, pilis simplicibus. Perennis. *Pr. l. c.* sub nomine *Apargiae.*

Habitat in pratis montuosis Matesii, e Pollini.

151. *Hedypnois coronopifolia.* Subacaulis, scapis diffusis, foliis oblongo-spathulatis obtusis, profunde dentato-hispidis, pilis trifurcatis, calycibus hispidis, pedunculis incrassatis. Annua. *Pr. p. XLVI.*

Habitat in arvis aridis Lucaniae.

152. *Hedypnois tubaeformis.* Caulibus diffusis recurvis ramosis, foliis obovato-spathulatis subdentatis hispidis, pilis simplicibus, calycibus hispidis, pedunculis clavatis fistulosis maximis. Annua. *Prod. loc. cit.*

Habitat in pratis montuosis Insulae Caprearum, et Lucaniae.

153. *Crepis corymbosa.* Foliis radicalibus obovato-runcinatis, caulinis lanceolatis, basi sagittato-multifidis, caule basi ramoso, floribus corymboso-paniculatis, calycibus hispidis. Annua. *Cychorium sylvestre alterum. Col. ecphr. II. p.* 235. *t.* 236.? *Pr. p. XLVII.*

Habitat in arvis prope Neapolim communis.

154. *Crepis cernua.* Foliis radicalibus, obovatis, lyrato-pinnatifidisque, angulato-dentatis glabriusculis, caulinis lanceolatis basi hastatis, caule simplici erecto superne ramoso, calycibus glabris, pedunculis cernuis. Annua. *Pr. l. c.*

Habitat ibid.

155. *Crepis lacera.* Foliis hispidis runcinatis pinnatifidis bipinnatifidisque, summis lanceolatis basi pinnatifidis, calycibus albo-tomentosis laevibus, squamis exterioribus linearibus adpressis. Planta bipedalis. Perennis. *Pr. sup. II. l. c.*

Habitat in apricis montanis communis.

Media inter *C. biennem* et *C. dioscoridis*; ab illa differt foliis laceris, calycibus laevibus squamis exterioribus depauperatis minime ovatis; a *C. dioscoridis* foliis hispidis laceris, floribus triplo majoribus, calycibus haud pilosis, fructigeris cylindricis, perennitate, aliisque notis. ?

156. *Hieracium pseudo-pilosella.* Foliis lanceolatis, petiolatis integerrimis pilosis, scapo subaphyllo unifloro, undique piloso; stolonibus reptantibus, calyce dense sericeo-villoso. Perennis. *Pr. sup. II. p. LXIX.*

Habitat in pascuis Magellae.

157. *Carduus corymbosus.* Foliis interrupte-decurrentibus, supra glabriusculis subtus tomentosis, laciniis palmato-angulatis, ciliato-spinosissimis, caule corymboso, floribus solitariis pedunculis tomentosis; calycinis squamis erectis subulatis villosis. Annuus. *Pr. p. XLVIII.*

Habitat in incultis Principatus Ulterioris, Samnii et Aprutii.

158. *Cnicus strictus.* Foliis semidecurrentibus lanceolatis sinuatis, lobis bifidis spinosis, subvillosis, floribus terminalibus glomeratis sessilibus, calycinis squamis patulis lanceolatis, subulato-spinosis. Perenn. *Pr. l. c.*

Habitat in saepibns montuosis Vesevi, Montis Virginis etc.

159. *Gnaphalium nivale.* Caule herbaceo simplicissimo, foliolis obovato-spathulatis obtusis, utrinque dense tomentosis, floribus terminalibus sessilibus

aggregatis, bracteis ovali-oblongis dense lanatis, radiato-patentibus, calycibus tomentosis, squamis margine fuscis. Perenne? *Pr. l. c.*

Habitat in editioribus Magellae, prope nives.

A *G. leontopodiode* differt foliis obovatis, utrinque tomentosis, non lineari-lanceolatis, subtus tantum tomentosis.

160. *Senecio foeniculaceus.* Corollis revolutis, foliis subvillosis, inferioribus petiolatis, ovalibus sinuatis dentatis, superioribus amplexicaulibus oblongis, sinuato-pinnatifidis dentatis, summis lanceolatis denticulatis, radio paucifloro, floribus corymbosis. Annuus. *Pr. p. XLIX. Jacobea annua Senecionis folio foeniculi odore.* Tilli hort. pisan. pag. 76. tav. 28. icon. mala.

Habitat in sylvis prope Neapolim.

161. *Arnica lanigera.* Foliis ovato-lanceolatis per petiolum decurrentibus, summis amplexicaulibus acuminatis, inaequaliter dentatis lanuginosis, caule striato lanato; calycinis laciniis lineari-subulatis. Perennis. *Pr. l. c.*

Habitat in pratis montuosis Aprutii Ulterioris.

162. *Doronicum columnae.* Foliis dentato-angulatis scabriusculis, radicalibus cordato-reniformibus longe petiolatis, inferioribus auriculatis, mediis spathulato-cordatis, summisque ovato-lanceolatis, rotundatis amplexicaulibus, caule unifloro glabro. Perenne. *Pr. p. XLIX. Doronicum nigra radice campoclarense. Column. ecphr II. tav. 46.*

Habitat in sylvis montuosis borealibus.

163. *Pyrethrum tenuifolium.* Foliis bipinnatis

villosis, foliolis lanceolatis omnibus distinctis, inciso-serratis, serraturis mucronato-aristatis, pedunculis corymbosis. Perennis. *Pr. p. L.*

Habitat in nemoribus Magellae.

164. *Anthemis Barrelieri.* Foliis pinnatis, pinnis tri-quinquepartitisve sericeo-tomentosis, calycinis squamis margine sphacelatis glabriusculis, corollis concoloribus albis, radii subrotundis, caulibus simplicibus unifloris procumbentibus. Perennis. *Pr. p. L. Chamaemelum montanum incanum absynthoides italicum.* Bar. ic. 457.

Habitat in saxosis Magellae et Pollini.

165. *Anthemis petraea.* Foliis pinnatis glabris subcarnosis, pinguis tri-quinquefidisve obtusis, calycinis squamis margine sphacelatis glabris, corollis discoloribus, radii ellipticis, caulibus simplicibus adscendentibus unifloris. Perennis. *Pr. l. c.*

Habitat ibidem.

166. *Achillea punctata.* Foliis bipinnatis utrinque villoso-punctatis circumscriptione ovali, foliolis linearibus trifidis incisisque mucronatis, corymbo composito compacto multifloro, floribus sulphureis. Perennis. *Pr. l. c.*

Habitat in pratis montuosis Magellae et Matesii.

167. *Centaurea spathulata.* Calycibus ciliatis, squamis intimis scariosis fuscis, foliis inferioribus sublyratis, superioribus spathulatis serratis scabris, summis oblongo-ellipticis obtusis integerrimis. Perennis. *Pr. p. LI.*

Habitat in rupibus calcareis Magellae, prope Sacellum S. Spiritus.

168. *Centaurea dissecta.* Calycibus ciliatis, squamis omnibus uniformibus nigro-maculatis, ciliis albis, foliis inferioribus pinnatifidis, laciniis remotis lanceolato-linearibus subintegerrimis scabris, sublanuginosis, summis lanceolato-linearibus subdentatis. Perennis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat cum praecedente.

169. *Centaurea ceratophylla.* Calycibus ciliato-spinosis, foliis caulinis pinnatis, radicalibus bipinnatis, pinnis lanceolatis linearibusque lanuginosis, caule adscendente laevi, lanuginoso. Perennis. *Pr. l. c. An. Jacea montana lutea minima tenuifolia Col. ecphr. 1. pag.* 36. *tav.* 35. *fig.* 2. ?

Habitat ibidem.

170. *Centaurea incana.* Calycibus scariosis ovatis, squamis laceris submuticis, medio nigro-maculatis, foliis inferioribus lyrato-pinnatifidis, lobis lanceolatis obtusis, mucronatis, utrinque tomentoso-incanis integerrimis. Perennis. *Pr. pag. LII.*

Habitat ibidem.

171. *Centaurea deusta.* Calycibus scariosis ovatis, squamis laceris submuticis, medio longitudinaliter nigro-maculatis, foliis inferioribus bipinnatifidis, superioribus pinnatis, pinnis lanceolato-linearibus integerrimis. Perennis. *Pr. p. LI.*

Habitat in collibus aridis apricis prope Neapolim.

A *C. amara* differt calycibus ciliato-serratis, nec scariosis, foliisque ovatis.

172. *Orchis pseudo-sambucina.* Bulbis subpalmatis, labello trilobo, lobis ovatis intermedio minore emarginato, omnibus crenatis subincisis, petalis

exterioribus reflexis, cornu conico adscendente germine longiore; bracteis foliaceis floribus duplo-longioribus. *Prodr. pag. LII.* sub nomine *O. bracteatae.*

Habitat in collibus aridis prope Puteolos.

173. *Orchis Cyrilli.* Bulbis subrotundis, labello leviter trilobo, lobo intermedio emarginato, lateralibus crenato-erosis subincisisque, petalis exterioribus patentibus, cornu germine subaequante adscendente, bracteis germine brevioribus, foliis maculatis. *Pr. l. c.* (*Orchis pallens. Cyrilli. icon. ined. non Will.*)

Habitat in sylvis prope Neapolim.

174. *Orchis pauciflora.* Bulbis subrotundis, labello lato convexo laeviter trilobo, lobo medio integerrimo punctis regularibus inscripto, petalis exterioribus reflexis, interioribus rotundatis, cornu adscendente germine subaequante, bracteis germine brevioribus. *Pr. l. c.*

Habitat in pratis montuosis Lucaniae.

175. *Orchis quadripunctata.* Bulbis subrotundis, labello tripartito laciniis lateralibus ovatis, media obovata majore subemarginata, quadripunctata, petalis patentibus obtusis cornu germine subaequante recto filiformi, bracteis germine brevioribus. *Pr. p. LIII.*

Habitat in pratis Apuliae.

176. *Orchis Nicodemi.* Cyrilli icon. ined. Bulbis, subrotundis, labello trilobo, lobis ovalibus dilatatis subaequalibus crenulatis, medio subemarginato punctato, petalis exterioribus patentibus acu-

tis, cornu germine subaequante adscendente, bracteis germine longioribus. *Pr. l. c.*

Habitat ibid.

177. *Orchis parviflora.* Bulbis subrotundis, labello tripartito, lacinia intermedia elongata emarginata denticulo interjecto, laciniis omnibus oblongis obtusis crenulatis, petalis conniventibus exterioribus subulatis, cornu germine triplo breviore, bracteis germine brevioribus, foliis maculatis. *Pr. loc. cit.*

Habitat in pratis montuosis Lucaniae.

Hoc nomen servandum, quum *parviflora.* Will. nihil aliud sit nisi *ustulata* vera, ut in culta edoctus fuit. Claris. Balbis, ac mihi in literis benevole comunicavit.

178. *Orchis saccata.* Bulbis subrotundis, labello obovato integro crenulato, petalis conniventibus cornu ampliato, scrotiformi triplo germini breviore, bracteis germine longioribus, foliis maculatis. *Pr. loc. cit.*

Habitat in pratis montuosis Lucaniae.

179. *Helleborine longipetala.* Labello trilobo, lobis lateralibus obtusis, medio lanceolato acuminato elongato, basi barbato, bracteis maximis coloratis.

Habitat in aridioribus, ad vesevi basim, loco vulgo dicto *il Mauro*, *le Mortelle* etc.

180. *Alnus cordifolia.* Foliis ovatis, basi cordatis acutiusculis serratis nitidis, axillis venarum subtus villosis. *Pr. p. LIV.*

Habitat in vallibus prope, Neapolim et in nemo-

ribus montuosis Principatuum et Calabriarum.

181. *Quercus frainetto.* Foliis obovatis dilatatis pinnatifido - sinuatis subtus pubescentibus, laciniis oblongis obtusis; calycibus fructus, haemisphaericis, squamis lanceolatis villosis adpressis. *Prodr. suppl. II. pag. LXIX.*

Habitat in nemoribus Calabriae Ulterioris prope *Roglianum.*

A *Q. cerri* differt imprimis capsulis minime echinatis.

182. *Pinus brutius.* Foliis geminis rigidis glaberrimis planiusculis; strobilis ovatis glabris geminis, peduculatis, foliis triplo brevioribus, squamis obtusis. *Pr. l. c.*

Habitat in finitimis montibus Calabriae Ulterioris: in *Aspromonte* etc.

Affinis *P. Halepensi* et *maritimae;* differt ab illa strobilis ovatis, foliis triplo brevioribus, nec conicis foliis subaequantibus; a *P. maritima* foliis crassioribus rigidis, strobilis minoribus.

183. *Acer Neapolitanum.* Foliis subrotundis quinquelobis acutiusculis, subtus pubescentibus, grosse dentatis, corymbis pendulis, pedunculis, samarisque pilosis, alis semipatentibus. Arbor excelsa Polygamo-dioica.

Habitat in siccis et montosis prope Neapolim in loco vulgo dicto: *li Camaldoli*; in collibus Amalphitanis et Surrentinis, praecipuae prope Stabias, in loco vulgo dicto: *qui si sana*; in montibus Samnii, Aprutii et alibi.

Ab *acero* obtusata Will. differt corymbis pen-

dulis nec erectis, foliis profunde quinquelobis dentatis, non integerrimis. Ab *acero opulo* differt magnitudine, corymbis pendulis nec laxis erectis, foliis subtus glauco-pubescentibus, profunde-quinquelobis acutis, non subtus glabris laevissime quinquelobis obtusis, alis samararum patentibus, non approximatis. Ab *A. opulifolio* Villarsii differt foliis subtus pubescentibus, non glabris, alis samararum semipatentibus minime approximatis, ligno albo evene, haud flavo venosiore, magnitudinae, aliisque notis.

184. *Atriplex diffusa.* Caule herbaceo procumbente ramosissimo, foliis deltoidibus, triangulari-lanceolatisque, obtusissimis subsinuatis, calycibus fructus deltoideo-hastatis, auriculatis dentatis, disco laevi, floribus spicatis. Annua. *Pr. p. LVII.*

Habitat in arena litoris prope Bajas.

185. *Marsilea pubescens.* Foliis quaternis integerrimis pubescentibus; fructibus sessilibus aggregatis villosis. Perennis. *Prodr. sup. pag. LXX.*

Habitat in inundatis Lucaniae, in loco vulgo dicto, *Oliveto di S. Basile*: prope *Pisticcium.*